

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Lacrifluid, collyre

Qu'est-ce que le Lacrifluid et quand doit-il être utilisé?

Les larmes artificielles Lacrifluid sont utilisées sur recommandation du pharmacien ou prescription du médecin pour l'humidification des yeux dans le syndrome de l'œil sec d'origines diverses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis par votre pharmacien ou droguiste afin de traiter vos troubles oculaires, le syndrome de l'œil sec. Ne l'utilisez pas pour le traitement d'autres maladies et ne le remettez pas à d'autres personnes.

Remarque aux porteurs de lentilles de contact: Si vous portez des lentilles de contact, ôtez-les avant d'instiller Lacrifluid, puis attendez au moins 20 minutes avant de les remettre.

Quand Lacrifluid ne doit-il pas être utilisé?

N'utilisez pas Lacrifluid en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Lacrifluid?

Si aucune amélioration ne survient après 2 à 3 jours, veuillez consulter votre médecin. Un traitement de longue durée doit être effectué sous surveillance médicale. En cas d'aggravation ou d'apparition de nouveaux symptômes, par exemple une baisse de l'acuité visuelle, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais. On note parfois des troubles visuels (vision brouillée) immédiatement après l'instillation de Lacrifluid. Dans ces cas, il est recommandé de ne pas conduire de véhicule ou d'utiliser des machines jusqu'à la normalisation de la vision.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'autres maladies, si vous êtes allergique, si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou en application dans l'œil (même en automédication).

Lacrifluid peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

L'utilisation pendant la grossesse ou l'allaitement ne doit se faire qu'avec l'autorisation de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Lacrifluid?



Adultes: Instiller 3 fois par jour une goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil atteint. Si besoin, vous pouvez augmenter le nombre d'instillations quotidiennes.

Utilisation

Veuillez vous laver soigneusement les mains avant d'utiliser Lacrifluid. Ne pas toucher l'œil avec l'embout du flacon afin de préserver la stérilité du collyre.

Si vous devez utiliser d'autres médicaments pour les yeux, veuillez respecter un intervalle d'au moins 15 minutes entre les différentes instillations. Lacrifluid étant toujours instillé en dernier.

Il n'est pas recommandé d'utiliser Lacrifluid chez les enfants et les adolescents du fait qu'aucune étude systématique n'a été effectuée dans ces classes d'âge.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Lacrifluid peut-il provoquer?

L'utilisation de Lacrifluid peut entraîner les effets secondaires suivants:

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Des réactions d'hypersensibilité à l'un des composants, troubles de la vision passagers et sensation de brûlure ou piquûre légère immédiatement suite à l'instillation de Lacrifluid, résultant en une vision brouillée passagère, sensation des paupières collées et irritations suite à l'application.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Reboucher le flacon après utilisation. Après ouverture du flacon, ne pas utiliser Lacrifluid au-delà de quatre semaines.

Remarques concernant le stockage

Conservez le médicament dans son emballage d'origine fermé, à température ambiante (15-25 °C), et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Une fois le traitement terminé, rappez le médicament restant sur le lieu de distribution (cabinet médical, pharmacie ou droguerie) qui se chargera de l'éliminer correctement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Lacrifluid?



1 ml Lacrifluid, collyre contient:

Principes actifs

1,3 mg de Carbomerum 980

Excipients

Cetrimide, sorbitol, édétate disodique, hydroxyde de sodium, eau purifiée

Numéro d'autorisation

57824 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Lacrifluid? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Lacrifluid, collyre en flacon de 10 ml (D)

Titulaire de l'autorisation

CHEPLAPHARM Schweiz GmbH, Huebweg 18-20, 4102 Binningen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

