

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Traumeel, comprimés

Médicament homéopathique

Quand Traumeel est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Traumeel peut être utilisé comme traitement de soutien en cas de contusions et d'entorses ainsi que d'états douloureux de l'appareil locomoteur.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre état général s'aggrave, vous devez consulter immédiatement un médecin. Ce médicament ne doit pas être utilisé plus de 8 semaines sans consulter votre médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Traumeel peut être pris simultanément.

Quand Traumeel ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Traumeel est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'un des principes actifs ou à l'un des adjuvants. Hypersensibilité à l'arnica ou à d'autres astéracées.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Pour des questions de prudence, les médicaments contenant de l'échinacée ne doivent pas être utilisés en raison de possibles effets immunostimulants dans les cas suivants:

- Maladies systémiques évolutives (telles que tuberculose, sarcoïdose, maladies du système des globules blancs comme les leucémies).
- Maladies auto-immunes (telles que collagénoses, sclérose en plaques).
- Maladies virales chroniques (comme l'hépatite B).
- Immunodéficience (SIDA/Infections VIH).

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Traumeel peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments



durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Traumeel?

Sauf prescription contraire du médecin, pour les adultes et les adolescents de plus de 12 ans, prendre 1 comprimé 3 fois par jour. Sur prescription du médecin, pour les enfants de 6 à 11 ans, prendre 1 comprimé 2 fois par jour. Pour les enfants de 2 à 5 ans, prendre 1 comprimé 1 à 2 fois par jour.

Dans les cas aigus, pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, prendre 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Sur prescription du médecin, pour les enfants de 6 à 11 ans, prendre 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure jusqu'à 8 fois par jour. Pour les enfants entre 2 à 5 ans, prendre 1 comprimé jusqu'à 6 fois par jour.

Il est préférable de laisser fondre les comprimés dans la bouche avant de les avaler. Les enfants peuvent réduire les comprimés en petits morceaux et les boire mélangés à de l'eau.

Ne doublez pas la dose, si vous oubliez de prendre la dose précédente.

Ce médicament ne doit pas être utilisé plus de 8 semaines sans consulter votre médecin.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Traumeel peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants ont été observés lors de la prise de Traumeel ou de médicaments de la même composition: réactions d'hypersensibilité sous forme d'éruption cutanée avec démangeaisons ainsi que diarrhée. Leur survenue nécessite d'arrêter la médication et de demander conseil à un médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci est aussi valable pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Traumeel et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Traumeel?



1 comprimé (301,5 mg) contient:

Principes actifs

Achillea millefolium (HAB) D3 15 mg
Aconitum napellus (HAB) D3 30 mg
Atropa bella-donna (HAB) D4 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 75 mg
Hepar sulfuris (HAB) D8 30 mg
Matricaria recutita (HAB) D3 24 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni (HAB) D8 30 mg
Symphytum officinale (HAB) D8 24 mg
Bellis perennis (HAB) D2 6 mg
Calendula officinalis (HAB) D2 15 mg
Echinacea (HAB) D2 6 mg
Echinacea purpurea (HAB) D2 6 mg
Hamamelis virginiana (HAB) D2 15 mg
Hypericum perforatum (HAB) D2 3 mg
Arnica montana (HAB) D2 15 mg

Lactose monohydraté 300 mg, magnésium stéarate.

Numéro d'autorisation

62285 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Traumeel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 et 250 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

