

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Traumeel, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Traumeel?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Traumeel può essere usato come coadiuvante in caso di contusioni o distorsioni e stati dolorosi dell'apparato motorio.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se le condizioni generali peggiorano, è necessario consultare immediatamente un medico. Questo farmaco non deve essere utilizzato per più di 8 settimane senza consultare il medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Traumeel.

Quando non si può assumere Traumeel e quando la sua somministrazione suo uso richiede prudenza?

Traumeel non deve essere usato nei soggetti con ipersensibilità a uno dei principi attivi o eccipienti. Ipersensibilità all'arnica o ad altre composite.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

In linea di massima, a causa dei loro possibili effetti immunostimolanti, i medicinali a base di echinacea non devono essere usati in caso di:

- malattie sistemiche progressive (come tubercolosi, sarcoidosi, malattie del sangue, p. es. leucemia)
- malattie autoimmuni (come collagenosi, sclerosi multipla),
- malattie virali croniche (come epatite B),
- immunodeficienza (infezioni da AIDS/HIV).

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente!

Si può assumere Traumeel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.



Come usare Traumeel?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti e adolescenti sopra i 12 anni:

assumere 1 compressa 3 volte al giorno. Dietro prescrizione medica, bambini tra 6 e 11 anni, assumere 1 compressa 2 volte al giorno. Bambini tra 2 e 5 anni, assumere 1 compressa 1-2 volte al giorno.

In casi acuti, adulti e adolescenti sopra i 12 anni, assumere 1 compressa ogni mezz'ora fino ad ogni ora per un massimo di 12 volte al giorno. Dietro prescrizione medica, bambini tra 6 e 11 anni, assumere 1 compressa ogni mezz'ora fino ad ogni ora per un massimo di 8 volte al giorno, bambini tra 2 e 5 anni: assumere 1 compressa per un massimo di 6 volte al giorno.

Far sciogliere lentamente in bocca la compressa prima di deglutirla. I bambini possono assumere le compresse sminuzzate e mescolate con un po' d'acqua.

Non assumere una dose doppia se si dimentica di prendere la dose precedente.

Questo medicinale non deve essere utilizzato per più di 8 settimane senza consultare il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Traumeel?

I seguenti effetti collaterali sono stati osservati con l'assunzione di Traumeel o farmaci con la stessa composizione: reazioni d'ipersensibilità con eruzione cutanea, prurito e diarrea. In questi casi si deve sospendere la somministrazione del medicamento e consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Traumeel e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Traumeel?

1 compressa (301,5 mg) contiene:

Principi attivi

Achillea millefolium (HAB) D3 15 mg

Aconitum napellus (HAB) D3 30 mg



Atropa bella-donna (HAB) D4 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 75 mg

Hepar sulfuris (HAB) D8 30 mg

Matricaria recutita (HAB) D3 24 mg

Mercurius solubilis Hahnemanni (HAB) D8 30 mg

Symphytum officinale (HAB) D8 24 mg

Bellis perennis (HAB) D2 6 mg

Calendula officinalis (HAB) D2 15 mg

Echinacea (HAB) D2 6 mg

Echinacea purpurea (HAB) D2 6 mg

Hamamelis virginiana (HAB) D2 15 mg

Hypericum perforatum (HAB) D2 3 mg

Arnica montana (HAB) D2 15 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300,0 mg, magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

62285 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Traumeel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 e 250 compresse.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

