

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Entumin®

Medius AG

Che cos'è Entumin e quando si usa?

Entumin può essere usato solo su prescrizione medica nel quadro di un episodio patologico attuale. Dal punto di vista della sua azione, Entumin è un cosiddetto neurolettico. Il principio attivo contenuto è la clotiapina, una sostanza del gruppo delle dibenzotiazepine, impiegata nella terapia dei disturbi psichici, soprattutto delle forme psicotiche come p.es. la schizofrenia o i disturbi bipolari, ma anche degli stati di ansia o di tensione e dei gravi disturbi del sonno legati a malattie psichiche.

Quando non si può assumere Entumin?

In caso di ipersensibilità nota al principio attivo Clotiapina o ad uno degli eccipienti di Entumin. In caso di obnubilazione della coscienza (stati comatosi) o di funzioni cerebrali molto ridotte, Entumin non può essere usato. Se è a rischio di convulsioni (epilessia), deve informare assolutamente il medico: l'interruzione o la cessazione improvvisa della terapia o importanti cambiamenti della dose sono in questo caso controindicati.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Entumin?

Ai pazienti anziani con demenza, Entumin, come altri neurolettici, va prescritto con grande prudenza o non va prescritto del tutto.

Informi assolutamente il suo medico se ha già sofferto in passato di un colpo apoplettico o se ha avuto un coagulo di sangue (trombosi), se ha problemi cardiaci come p.es. disturbi del ritmo cardiaco o un numero ridotto di globuli bianchi (leucociti), oppure se soffre o ha sofferto in passato di iperplasia della prostata, glaucoma, blocco intestinale, convulsioni (epilessia) o encefalite (infiammazione del cervello).

Entumin può ridurre la capacità di reazione, la capacità di utilizzare attrezzi o macchine e la capacità di condurre un veicolo. Per questo motivo è necessario rinunciare alla guida e all'utilizzo di attrezzi e macchine finché non si conoscono le proprie reazioni al medicamento. Ne parli con il suo medico. Entumin può intensificare l'effetto di alcol, sonniferi e tranquillanti, antidolorifici e preparati contro le allergie.

Lattosio

Entumin contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Entumin durante la gravidanza o l'allattamento?

Se si impiega Entumin durante l'ultimo trimestre di gravidanza, il neonato può mostrare tremore, rigidità muscolare, debolezza, sonnolenza, agitazione, difficoltà respiratorie o problemi nell'assunzione del cibo. Informi immediatamente il suo medico nel caso di una gravidanza per discutere come proseguire ulteriormente. Il trattamento non va interrotto in nessun caso di propria iniziativa. Un'interruzione improvvisa di Entumin può avere conseguenze molto gravi. Informi immediatamente anche il suo ginecologo o l'ostetrica dell'assunzione durante la gravidanza, soprattutto nel caso in cui insorgessero disturbi nel bambino dopo il parto.

Come usare Entumin?



La posologia e l'ora di assunzione sono stabiliti dal medico, individualmente, secondo il tipo e la gravità dei disturbi.

Le compresse hanno una linea di frattura in cui è possibile dividerle per facilitarne l'assunzione. Tuttavia, la linea di frattura non è adatta per il dosaggio di una dose parziale. Se la posologia prescritta prevede di dimezzare le compresse, è necessario usare un tagliapillola in vendita in farmacia.

Popolazione pediatrica

L'uso e la sicurezza di Entumin non sono stati studiati nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Entumin?

Durante l'assunzione di Entumin possono insorgere i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Agitazione, stati confusionali.

Effetti anticolinergici, sintomi extrapiramidali, distonia, acatisia, parkinsonismo, discinesia tardiva, sedazione.

Fluo visivo.

Ipotensione ortostatica.

Secchezza della bocca, stitichezza.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Sintomi motori extrapiramidali e/o sintomi di astinenza nel neonato.

Sindrome maligna da neurolettici.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare al riparo dall'umidità e a temperatura non superiore ai 30°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Entumin?

1 compressa (con linea di frattura) contiene:

Principi attivi

40 mg di clotiapina

Sostanze ausiliarie

Paraffina liquida densa, Silice colloidale anidra, Gelatina, Amido di mais, Lattosio monoidrato, Magnesio stearato, Talco, Cellulosa microcristallina.



Numero dell'omologazione

33639 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Entumin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

30 compresse (con linea di frattura) e 100 compresse (con linea di frattura).

Titolare dell'omologazione

Medius AG, 4132 Muttenz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

