

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista (o del suo droghiere). Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

DAFLON® UNO 1000 mg, compresse masticabili

Servier (Suisse) SA

Che cos'è DAFLON UNO e quando si usa?

Daflon Uno contiene sostanze con proprietà toniche e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico dei vasi sanguigni.

Daflon Uno compresse masticabili è usato nel trattamento delle turbe della circolazione sanguigna venosa e degli edemi.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

A questo proposito, segua le raccomandazioni del medico, non solo in merito alla prescrizione, ma anche riguardanti l'eventuale ginnastica da eseguire e l'uso di calze elastiche (calze da varici).

Quando non si può usare DAFLON UNO?

Ipersensibilità (allergia) sospettata o nota alla frazione flavonoica, a uno degli eccipienti di Daflon Uno o ad altri flavonoidi.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di DAFLON UNO?

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista (o il suo droghiere), nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Daflon Uno contiene 1227 mg di sorbitolo per compressa masticabile. Il sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il suo medico l'ha informata che ha un'intolleranza a determinati zuccheri o se le è stata diagnosticata un'intolleranza ereditaria al fruttosio (HFI), una rara malattia genetica caratterizzata dall'incapacità di scomporre il fruttosio, si rivolga al medico prima di prendere o ricevere questo medicamento.

Daflon Uno contiene alcol benzilico.

L'alcol benzilico può provocare reazioni allergiche.

Si può usare DAFLON UNO durante la gravidanza o l'allattamento?

Come misura precauzionale, è meglio evitare l'uso del medicamento durante la gravidanza.

In assenza di dati sul passaggio nel latte materno l'allattamento non è raccomandato durante il periodo di trattamento.

Chiedete consiglio al vostro medico o al farmacista prima di prendere questo medicamento se siete incinta o in allattamento, se pensate di essere incinta o se avete intenzione di avere un bambino.

Come usare DAFLON UNO?

Adulti: la posologia abituale è di 1 compressa al giorno, al mattino al momento dei pasti. La compressa deve essere masticata intera e deglutita.

L'uso e la sicurezza di Daflon Uno nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Se avesse assunto una dose maggiore del dovuto di Daflon Uno, voglia prendere contatto immediatamente con il suo medico o il suo farmacista. L'esperienza di sovradosaggio con Daflon Uno è limitata. I sintomi di overdose più comunemente riportati includono diarrea, nausea, dolore addominale, prurito ed eruzione cutanea.

Quali effetti collaterali può avere DAFLON UNO?

L'assunzione di Daflon Uno può causare degli effetti collaterali, i quali, tuttavia, non si riscontrano necessariamente in ciascun caso. In ordine decrescente di frequenza si notano i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Diarrea, indigestione, nausea e vomito.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Colite.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Vertigini, mal di testa, malessere, eruzione cutanea, prurito, orticaria.

Singoli casi

Dolori addominali, edemi localizzati del volto, delle palpebre, delle labbra.

Eccezionalmente: edema di Quincke.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista (o droghiere), soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C), fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista (o il droghiere), che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Ulteriori indicazioni

Eliminazione

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene DAFLON UNO?

Principi attivi

1 compressa masticabile contiene: frazione flavonoica purificata, micronizzata 1000 mg, costituita da 900 mg di diosmina e 100 mg di flavonoidi espressi in esperidina.

Sostanze ausiliarie

Mannitolo (E421), sorbitolo (E420), maltodestrina, aroma di arancia (contenente alcol benzilico (E1519)), acesulfame potassico (E950), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra. Contiene 1227 mg di sorbitolo per compressa masticabile.

Numero dell'omologazione



68966 (Swissmedic)

Dove è ottenibile DAFLON UNO? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Daflon Uno 1000 mg compresse masticabili:

Scatola da 30 compresse masticabili in blister.

Titolare dell'omologazione

SERVIER (SUISSE) S.A.

1202 Genève

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

