

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel anwenden.

Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Fusicutan® Salbe

Dermapharm AG

Was ist Fusicutan Salbe und wann wird es angewendet?

Fusicutan Salbe ist ein Antibiotikum und wird auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin zur Bekämpfung und Vorbeugung bakterieller Infektionen der Haut eingesetzt.

Fusicutan Salbe wird bei Hautinfektionen und Verbrennungen eingesetzt.

Wann darf Fusicutan Salbe nicht angewendet werden?

Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Fusidinsäure, oder gegenüber einem Hilfsstoff gemäss Zusammensetzung dürfen Sie Fusicutan Salbe nicht benützen (siehe auch «Was ist in Fusicutan Salbe enthalten?»).

Wann ist bei der Anwendung von Fusicutan Salbe Vorsicht geboten?

Wenn eine Hautkrankheit nicht innert einiger Tage auf die Behandlung anspricht, konsultieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin; eine Allergie oder eine Infektion durch unempfindliche Keime könnten die Ursache sein.

Bei der Anwendung im Gesicht sollte der Kontakt mit den Augen vermieden werden.

Fusicutan Salbe enthält Cetylalkohol, Wollwachs sowie Butylhydroxytoluol (E321), welche örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen können.

Butylhydroxytoluol kann zusätzlich Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Fusicutan Salbe während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Verwenden Sie Fusicutan Salbe, wenn Sie schwanger sind, es werden möchten oder stillen, nur nach Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin. Wird Fusicutan Salbe vom Arzt oder der Ärztin während der Stillzeit verordnet, so soll das Präparat nicht auf die Brust aufgetragen werden.

Wie verwenden Sie Fusicutan Salbe?

Fusicutan Salbe wird für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 2 Jahren, wenn von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin nicht anders verordnet, 1–2x täglich als Salbenverband auf die infizierte Hautstelle aufgetragen. Falls ein Verband schlecht möglich ist (z.B. im Gesicht), die Salbe 3x täglich auf die betroffene Hautstelle auftragen.

Eine 7tägige Behandlung wird in den meisten Fällen ausreichen.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Fusicutan Salbe haben?



Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Fusicutan Salbe auftreten:

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Anwendern)

Entzündungen der Haut (inkl. Ekzem), Hautausschlag (kann mit Pusteln, Bläschen und Rötung einhergehen), Juckreiz, Hautrötung, Schmerzen (inkl. Gefühl des Hautbrennens) oder Reizung an der Anwendungsstelle.

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Anwendern)

Überempfindlichkeitsreaktionen, Bindehautentzündung, Angioödem (plötzlich auftretende, schmerzlose Schwellung von Haut und Schleimhaut), Nesselsucht, oder Blasenbildung.

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen, insbesondere wenn diese mit einer Schwellung von Haut und Schleimhäuten einhergehen, sowie beim Auftreten von Nesselsucht und Blasenbildung, informieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Lagerungshinweis

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Fusicutan Salbe nicht über 30 °C lagern.

Weitere Hinweise

Verfallene Arzneimittel sollten zur Entsorgung in die Apotheke gebracht werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Fusicutan Salbe enthalten?

Wirkstoffe

1 g Salbe enthält als Wirkstoff 20,3 mg Fusidinsäure 0,5 H₂O (entsprechend 20,0 mg Fusidinsäure wasserfrei).

Hilfsstoffe

Weisses Vaseline, Wollwachs, Butylhydroxytoluol (E 321), Cetylalkohol, dickflüssiges Paraffin, all-rac- α -Tocopherol

Zulassungsnummer

62252 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Fusicutan Salbe? Welche Packungen sind erhältlich?

Fusicutan Salbe erhalten Sie in Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Salbe: Tuben zu 15 g und 30 g.

Zulassungsinhaber

Dermanharm AG, Hünenberg



Diese Packungsbeilage wurde im April 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

