

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Fusicutan® pommade

Dermapharm AG

Qu'est-ce que Fusicutan pommade et quand doit-il être utilisé?

Fusicutan pommade est un antibiotique utilisé sur prescription médicale pour combattre et prévenir les infections bactériennes au niveau de la peau.

Fusicutan pommade est appliquée en cas d'infections cutanées et de brûlures.

Quand Fusicutan pommade ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser Fusicutan pommade en cas d'hypersensibilité connue au principe actif acide fusidique, ou à l'un des excipients selon la composition (voir aussi «Que contient Fusicutan pommade?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fusicutan pommade?

Si l'affection cutanée ne s'améliore pas après quelques jours de traitement, veuillez consulter votre médecin; une allergie ou une infection provoquée par des germes résistants peuvent en être l'origine.

Lors d'application de Fusicutan pommade sur le visage le contact avec les yeux doit être évité. Fusicutan pommade contient de l'alcool cétylique, de la graisse de laine et du butylhydroxytoluène

(E 321), qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par ex. dermite de contact).

Le butylhydroxytoluène peut aussi provoquer une irritation des yeux et des muqueuses.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication !).

Fusicutan pommade peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, si vous désirez le devenir ou si vous allaitez, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser Fusicutan pommade. Si Fusicutan pommade est prescrit par le médecin pendant l'allaitement, le médicament ne doit pas être appliqué sur la poitrine.

Comment utiliser Fusicutan pommade?

Sauf avis contraire de votre médecin, pour les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 2 ans, la pommade Fusicutan s'applique 1 à 2 fois par jour sur les régions cutanées infectées, sous forme de pansement. Si un pansement est difficilement réalisable (p.ex. sur le visage), appliquer la pommade 3x par jour sur la zone cutanée concernée.

Un traitement de 7 jours est généralement suffisant.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fusicutan pommade peut-il provoquer?

L'utilisation de Fusicutan pommade peut provoquer les effets secondaires suivants:



Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Des inflammations de la peau (y compris de l'eczéma), des éruptions cutanées (qui peuvent s'accompagner de pustules, de vésicules et de rougeurs), des démangeaisons, une rougeur de la peau, des douleurs (y compris une sensation de brûlure de la peau) ou une irritation au site d'application ont été observés.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Des réactions d'hypersensibilité, des inflammations de la conjonctive, un angio-œdème (gonflement soudain, indolore de la peau et de la muqueuse), urticaire ou formation de vésicules.

En cas de survenue de réactions d'hypersensibilité, surtout si celles-ci s'accompagnent d'un gonflement de la peau et des muqueuses, ainsi qu'en cas de survenue d'urticaire ou de formation de vésicules, veuillez en informer immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

La durée de stabilité est de 6 mois après ouverture.

Remarques concernant le stockage

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas conserver la pommade Fusicutan au-dessus de 30°C.

Remarques complémentaires

Les médicaments périmés doivent être rapportés en pharmacie pour être éliminés correctement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Fusicutan pommade?

Principes actifs

1 g de pommade contient 20,3 mg du principe actif acide fusidique 0,5 H₂O (correspondant à 20,0 mg d'acide fusidique anhydre).

Excipients

Vaseline blanche, de la graisse de laine, du butylhydroxytoluène (E 321), de l'alcool cétyle, de la paraffine liquide, de l'alpha-tocophérol.

Numéro d'autorisation

62252 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Fusicutan pommade? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Vous obtenez Fusicutan pommade en pharmacie, sur ordonnance médicale.

Pommade: tubes de 15 g et 30 g.

Titulaire de l'autorisation

Dermapharm AG, Hünenberg



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

