

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Becozym® forte

Bayer (Schweiz) AG

Che cos'è Becozym forte e quando si usa?

Becozym forte contiene sette importanti vitamine del gruppo B. Come tutte le vitamine, anche le vitamine del gruppo B non possono essere prodotte autonomamente dall'organismo, ma devono essere assunte con gli alimenti.

Le vitamine del gruppo B sono componenti di enzimi molto particolari (fermenti). Hanno il compito di rendere i carboidrati, i grassi e le proteine degli alimenti utilizzabili per la produzione di energia, per la costruzione e il funzionamento di nervi, sangue, pelle, mucose e muscoli. L'interazione tra le vitamine del gruppo B è di importanza fondamentale.

Becozym forte contiene le vitamine del gruppo B necessarie all'organismo. Serve quindi alla prevenzione e al trattamento di carenze di vitamine del gruppo B già presenti, che possono avere le seguenti cause:

- Alimentazione ooco variata in regime leggero, cure dimagranti; consumo eccessivo di alcol e inappetenza (ad es. in caso di malattie febbrili).
- Medicamenti che neutralizzano l'effetto delle vitamine. Tra questi rientrano in particolare i preparati per il trattamento delle infezioni gravi (antinfettivi), i preparati che inibiscono la crescita delle cellule tumorali (citostatici) e quelli assunti per prevenire le crisi epilettiche (anticonvulsivanti).
- Malattie epatiche che compromettono l'incorporazione delle vitamine negli enzimi.
- Alcolismo cronico e le sue conseguenze, come danni a fegato, cuore e sistema nervoso.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Per i diabetici: 1 confetto contiene 270 mg di carboidrati = 4,6 kJ (1,1 kcal).

Becozym forte contiene lattosio.

Quando non si può assumere Becozym forte?

Se è allergico a uno dei principi attivi o a una delle sostanze ausiliarie secondo la composizione, non deve assumere questo preparato.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Becozym forte?

- Sovradosaggi acuti o cronici aumentano il rischio di effetti collaterali. Si deve tenere conto dell'assunzione di vitamine e sali minerali da altre fonti (alimenti arricchiti, integratori alimentari o assunzione concomitante di altri medicamenti).
- I pazienti che assumono altri prodotti vitaminici o medicamenti, che seguono una dieta specifica o che sono sotto controllo medico devono discutere l'assunzione di Becozym forte con il proprio medico, farmacista o droghiere.
- I pazienti con insufficienza renale grave devono discutere l'assunzione di Becozym forte con il proprio medico.

Se deve sottoporsi a esami di laboratorio durante l'assunzione di biotina, informi il suo medico. La biotina può influenzare i risultati. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Becozym forte.



Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere/usare Becozym forte durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza e l'allattamento può assumere vitamine e sali minerali in quantità corrispondente al fabbisogno quotidiano. Con dosi giornaliere come quelle fornite da Becozym forte, deve comunque assumere questo medicamento solo dopo aver consultato il suo medico.

Come usare Becozym forte?

La quantità giornaliera da assumere (dose giornaliera) dipende dalla sua età e dall'entità della carenza di vitamine del gruppo B incombente o già esistente. Salvo diversamente prescritto dal medico, dal farmacista o dal droghiere, si applicano le seguenti indicazioni posologiche:

Dose giornaliera per la prevenzione: Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni: 1 confetto una volta al giorno.

Dose giornaliera per il trattamento: Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni: 1 confetto due o tre volte al giorno.

I confetti possono essere ingeriti interi con del liquido.

Becozym forte non è destinato all'uso nei bambini sotto i 12 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Becozym forte?

Con l'assunzione di Becozym forte possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

mal di testa, reazioni allergiche fino ad anafilassi (arrossamento cutaneo, eruzione cutanea, prurito, gonfiore dei tessuti (edema) o del viso (angioedema), dispnea, asma, diarrea, abbassamento della pressione arteriosa, disturbi cardiaci, shock anafilattico).

Durante l'assunzione di Becozym forte, l'urina può colorarsi di giallo. La colorazione è dovuta all'eliminazione della vitamina B₂ (riboflavina) ed è innocua.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare il medicamento a temperatura ambiente (15–25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati a un punto di raccolta (ad es. farmacia, drogheria, studio medico) o a un centro di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Becozym forte?

Principi attivi

1 confetto contiene come principi attivi 15 mg di vitamina B₁ (tiamina nitrato), 15 mg di vitamina B₂ (riboflavina), 10 mg di vitamina B₆ (piridossina cloridrato), 10 µg di vitamina B₁₂ (cianocobalamina), 0,15



mg di biotina, 25 mg di calcio pantotenato, 50 mg di nicotinamide.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 52,6 mg, ossido di magnesio leggero, povidone K 90, talco (E 553b), stearato di magnesio (E 470B), saccarosio 224,2 mg, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, amido di riso, macrogol 6000, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), cera di montanglicole, aromi (cacao).

Numero dell'omologazione

20407 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Becozym forte? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confetti: 20, 50 e 100.

Titolare dell'omologazione

Bayer (Schweiz) AG, Zurigo.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

