

Informations importantes sur les opioïdes tels que Sevre-Long:

- **Dépendance médicamenteuse et potentiel d'abus:** l'utilisation répétée d'opioïdes tels que Sevre-Long peut entraîner le développement d'une tolérance et d'une dépendance physique et/ou psychique, mais aussi un usage abusif.
- **Dépression respiratoire:** l'utilisation de Sevre-Long peut ralentir ou affaiblir dangereusement votre respiration (dépression respiratoire) et provoquer une baisse de la pression artérielle. Si tel est le cas, veuillez vous adresser à votre médecin.
- **Utilisation concomitante d'alcool et d'autres médicaments:** l'utilisation concomitante de Sevre-Long avec de l'alcool et d'autres médicaments qui peuvent provoquer une somnolence, augmente le risque d'apparition d'effets secondaires dangereux qui peuvent entraîner la mort.
- **Exposition accidentelle:** l'utilisation accidentelle de Sevre-Long, notamment chez les enfants, peut entraîner un surdosage mortel.
- **Grossesse:** l'utilisation prolongée de Sevre-Long pendant la grossesse peut entraîner un syndrome de sevrage des opioïdes chez le nouveau-né qui peut engager le pronostic vital, si ce syndrome n'est pas détecté et traité.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique «Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Sevre-Long?»

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SEVRE-LONG®

Mundipharma Medical Company

Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Qu'est-ce que Sevre-Long et quand doit-il être utilisé?

Sevre-Long est un analgésique utilisé pour le traitement des douleurs persistantes modérées à fortes. Il est par ailleurs utilisé pour le traitement de substitution en cas de dépendance aux opioïdes, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychosociale.

Les capsules retard Sevre-Long contiennent des granulés qui libèrent de manière différée la morphine (principe actif) dans le tractus gastro-intestinal, ce qui permet au médicament d'agir pendant 24 heures. Ainsi, les capsules retard Sevre-Long ne doivent généralement être prises qu'une seule fois par jour, c'est-à-dire toutes les 24 heures.

Sevre-Long ne doit être utilisé que sur prescription du médecin et uniquement sous contrôle médical régulier.

Quand Sevre-Long ne doit-il pas être pris?

- En cas d'hypersensibilité (allergie) au principe actif morphine ou à l'un des excipients,
- en cas de trouble marqué de la fonction respiratoire, p.ex. asthme bronchique sévère ou rétrécissement chronique sévère des voies respiratoires,
- en cas de douleurs abdominales aiguës,
- en cas de paralysie intestinale,



- chez l'enfant de moins d'un an.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Sevre-Long?

Utiliser avec précaution dans les cas ci-après:

- augmentation sévère de la pression dans le cœur droit à la suite d'une hypertension pulmonaire (cœur pulmonaire sévère), asthme bronchique sévère ou difficultés respiratoires,
- arrêt respiratoire périodique pendant le sommeil (apnée du sommeil),
- insuffisance hépatique sévère,
- insuffisance rénale,
- hypothyroïdie,
- insuffisance des surrénales (maladie d'Addison),
- troubles psychiques dus à l'alcool ou à des états d'intoxication, dépendance à l'alcool ou réactions sévères lors d'un arrêt de la consommation d'alcool,
- lithiase biliaire ou autres maladies biliaires aiguës,
- pancréatite,
- affections intestinales inflammatoires ou associées à des rétrécissements (occlusives),
- grossissement de la prostate avec difficultés à la miction,
- pression artérielle faible ou élevée, maladies cardiovasculaires préexistantes,
- blessures à la tête, troubles de la conscience, épilepsie ou tendance aux convulsions,
- constipation,
- prise de médicaments du groupe des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO); Sevre-Long n'est pas indiqué en association concomitante avec des IMAO ou dans les 14 jours suivant l'arrêt d'un tel traitement,
- allaitement.

Si vous êtes âgé(e) ou présentez une faiblesse physique, vous pouvez éventuellement être plus sujet(te) à l'apparition d'effets indésirables. Par conséquent, veuillez être particulièrement prudent(e).

En cas de suspicion d'occlusion intestinale ou de paralysie intestinale (les signes de tels troubles sont des douleurs abdominales, l'absence de selles et un abdomen éventuellement dur), le traitement par Sevre-Long doit être immédiatement arrêté. Dans ce cas, tenez votre médecin rapidement informé.

Dépendance et abus

L'utilisation répétée d'opioïdes tels que Sevre-Long peut entraîner le développement d'une tolérance et d'une dépendance physique et/ou psychique, mais aussi un usage abusif. Un usage abusif de Sevre-Long peut avoir pour conséquence un surdosage dangereux pouvant être mortel. Si vous craignez de devenir dépendant à Sevre-Long, veuillez consulter votre médecin sans délai.

Les capsules retard Sevre-Long ne doivent être ni dissoutes puis injectées, ni inhalées, car cela peut entraîner des effets indésirables sévères avec issue potentiellement fatale.

Le contenu des capsules retard ne doit pas être mâché, ni broyé, car cela pourrait entraîner une libération plus rapide du principe actif et l'absorption d'une dose de morphine potentiellement fatale.

Problèmes respiratoires

L'utilisation de Sevre-Long peut ralentir ou affaiblir dangereusement votre respiration (dépression respiratoire) et provoquer une baisse de la pression artérielle. Cela peut entraîner une diminution de votre état de conscience, un état de somnolence ou la sensation d'être proche de la syncope. Si c'est le cas, veuillez consulter votre médecin.



Sevre-Long peut provoquer des troubles respiratoires liés au sommeil comme l'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil) et une hypoxémie liée au sommeil (diminution de la quantité d'oxygène dans le sang). Les symptômes peuvent se manifester par des pauses respiratoires pendant le sommeil, des réveils nocturnes, un essoufflement, des troubles du sommeil ou une somnolence excessive pendant la journée. En cas d'observation de ces symptômes par vous-même ou un proche, veuillez consulter votre médecin qui envisagera une réduction des doses de Sevre-Long.

Utilisation accidentelle

La prise accidentelle de Sevre-Long, notamment chez les enfants, peut entraîner un surdosage mortel. Sevre-Long doit être conservé hors de portée des enfants et les conditionnements entamés ou non utilisés doivent être éliminés conformément aux réglementations applicables.

Grossesse

L'utilisation prolongée de Sevre-Long pendant la grossesse peut entraîner un syndrome de sevrage des opioïdes chez le nouveau-né qui peut engager le pronostic vital, si ce syndrome n'est pas détecté et traité. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse, informez-en votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Sevre-Long.

Sensibilité à la douleur plus élevée

Consultez votre médecin si vous ressentez des douleurs ou si votre sensibilité à la douleur augmente (hyperalgésie) au cours de l'utilisation de Sevre-Long, si la dose plus élevée prescrite par votre médecin n'a aucun effet ou si vous éprouvez des douleurs dès quelque chose touche votre corps alors que ce n'était pas le cas auparavant (allodynie).

Insuffisance surrénalienne

Faiblesse, fatigue, perte d'appétit, nausées, vomissements ou hypotension peuvent être des symptômes indiquant une production insuffisante de cortisol, une hormone sécrétée par les glandes surrénales; il sera peut-être nécessaire que vous suiviez un traitement hormonal.

Hormones sexuelles en baisse et prolactine élevée

L'utilisation prolongée d'opioïdes peut provoquer une baisse des taux d'hormones sexuelles et une élévation du taux de prolactine, une autre hormone. Veuillez contacter votre médecin si vous constatez des symptômes tels que baisse de la libido, impuissance ou absence de menstruations (aménorrhée).

La capacité de reproduction peut être altérée par la morphine.

Une méthode de contraception fiable doit être utilisée pendant toute la durée du traitement par Sevre-Long, car ce médicament pourrait être nocif pour l'enfant à naître.

Réactions cutanées sévères d'origine médicamenteuse

Une pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), pouvant mettre la vie du patient en danger ou lui être fatale, a été rapportée dans le cadre de traitements à base de morphine. La plupart de ces réactions sont survenues au cours des 10 premiers jours de traitement. Si des signes ou symptômes évoquant l'une de ces réactions cutanées apparaissent, la morphine doit être arrêtée et un traitement de substitution doit être envisagé.

Douleurs abdominales/Inflammation du pancréas

Adressez-vous à votre médecin en cas d'apparition de symptômes tels que fortes douleurs épigastriques pouvant irradier dans le dos, nausées, vomissements ou fièvre car ces symptômes sont susceptibles d'être en relation avec une inflammation du pancréas (pancréatite) et du canal cholédoque.

Prise de Sevre-Long avec d'autres médicaments

Veuillez consulter votre médecin avant de prendre Sevre-Long avec d'autres médicaments, notamment avec les médicaments suivants:



- La prise concomitante de Sevre-Long et d'alcool et/ou de médicaments qui peuvent entraîner une somnolence (p.ex. des somnifères, des médicaments destinés à traiter l'épilepsie, les névralgies ou les états anxieux, de nombreux médicaments contre les réactions allergiques (antihistaminiques) ou des tranquillisants (comme les benzodiazépines)), augmente le risque d'apparition d'effets secondaires dangereux qui peuvent entraîner la mort. Veuillez informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez et respectez scrupuleusement la posologie recommandée par votre médecin.
- de la rifampicine pour traiter, p.ex. la tuberculose.
- certains médicaments utilisés pour traiter les caillots sanguins (p.ex. le clopidogrel, le prasugrel, le ticagrélor) peuvent avoir un effet retardé et diminué lorsqu'ils sont pris de manière concomitante avec Sevre-Long.
- le risque d'effets secondaires augmente si vous prenez Sevre-Long en même temps que des antidépresseurs (p.ex. citalopram, duloxétine, escitalopram, fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline, venlafaxine, amitriptyline, clomipramine, imipramine, nortriptyline). Adressez-vous à votre médecin si vous ressentez les symptômes suivants: troubles de la conscience (p.ex. agitation, hallucinations, coma), rythme cardiaque rapide, pression artérielle instable, fièvre, réflexes exagérés, mauvaise coordination, rigidité des muscles, symptômes gastro-intestinaux (p.ex. nausées, vomissements, diarrhée),

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez indiquer à vos médecins que vous prenez Sevre-Long.

L'utilisation de Sevre-Long peut induire une réaction positive lors de contrôles antidopage.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin pour savoir si vous pouvez conduire, utiliser des machines ou exécuter des travaux dangereux.

Sevre-Long contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par capsule, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Traitement de la douleur

Une accoutumance à Sevre-Long peut apparaître lors d'une prise prolongée. Cela signifie que des doses plus élevées peuvent être éventuellement nécessaires afin d'obtenir le soulagement souhaité de la douleur.

De plus, la prise prolongée de Sevre-Long peut provoquer une dépendance physique. En cas d'arrêt abrupt du traitement, des symptômes de sevrage tels qu'une agitation, des accès de transpiration et des douleurs musculaires peuvent apparaître. Si vous n'avez plus besoin de suivre ce traitement, il convient de réduire la dose journalière progressivement après concertation avec votre médecin.

Veuillez informer votre médecin si vous êtes dépendant(e) à l'alcool, aux médicaments ou à des drogues ou si vous souffrez de troubles psychiques. Il décidera si la prise de Sevre-Long pour traiter la douleur est adaptée dans votre cas.

Traitement de substitution de la dépendance aux opioïdes

Vous ne devez en aucun cas prendre d'autres opioïdes, des somnifères, des calmants (benzodiazépines, p.ex.), de l'alcool ou d'autres substances agissant sur le système nerveux central sans contrôle de votre médecin. L'association de ces substances avec Sevre-Long peut avoir des effets mettant en jeu le pronostic vital. Si vous ne parvenez pas à arrêter seul(e) la consommation de ces autres substances, veuillez impérativement en parler à votre médecin ou consulter un centre de conseil spécialisé. Les troubles tels que les douleurs, troubles du sommeil, dépressions ou états anxieux, notamment, peuvent être traités de manière ciblée.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
-



vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication!).

Sevre-Long peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

L'utilisation prolongée de Sevre-Long pendant la grossesse peut entraîner un syndrome de sevrage des opioïdes chez le nouveau-né qui peut engager le pronostic vital, si ce syndrome n'est pas détecté et traité. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse, informez-en votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Sevre-Long.

L'administration de Sevre-Long pendant l'accouchement peut entraîner un ralentissement de la respiration (dépression respiratoire) chez le nouveau-né.

Si vous allaitez, vous ne devez prendre Sevre-Long que si votre médecin juge que cela est absolument nécessaire.

Comment utiliser Sevre-Long?

Respectez toujours scrupuleusement les instructions de votre médecin concernant la prise de Sevre-Long. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Sauf prescription contraire, les capsules retard Sevre-Long doivent être prises avec suffisamment de liquide (un verre d'eau) une fois par jour, plus au moins toujours à la même heure, pendant ou entre les repas. Les capsules doivent être avalées entières, sans les croquer ni les mâcher.

En cas de difficultés de déglutition, les capsules peuvent être ouvertes, sur instruction du médecin. Dans ce cas, versez les granulés retard dans un verre, avalez-les, puis buvez de l'eau. Vous pouvez également prendre les granulés retard en les ajoutant à de l'eau froide ou en les saupoudrant sur des aliments mous froids (un yaourt, p.ex.). La préparation doit être avalée immédiatement et entièrement, sans être croquée ni mâchée.

Traitement de la douleur

La posologie dépend de l'intensité de votre douleur et de votre propre sensibilité et est déterminée par votre médecin. Pour les personnes ayant un poids corporel inférieur à 70 kg, les personnes âgées ou présentant une faiblesse physique, la dose habituelle au début du traitement est d'une capsule à 30 mg une fois par jour. Pour les personnes dont le poids corporel est supérieur à 70 kg, la dose habituelle est d'une capsule à 60 mg une fois par jour. En cas de besoin, le médecin augmentera progressivement la posologie.

Chez l'enfant, le schéma posologique est défini individuellement par le médecin en fonction de l'âge et des circonstances.

Informez votre médecin en cas d'apparition de douleurs entre les prises de Sevre-Long. Il pourra vous prescrire un analgésique à libération rapide (médicament de réserve) pour traiter ces accès douloureux.

En cas de prise de Sevre-Long à une dose supérieure à la dose prescrite, veuillez en informer immédiatement votre médecin.

Si vous avez oublié une fois de prendre votre capsule à l'heure habituelle, vous pouvez rattraper la prise dans les 16 heures qui suivent, puis prendre la prochaine dose à l'heure normale. Si vous avez dépassé le moment de la prise de plus de 16 heures, demandez conseil à votre médecin ou utilisez l'analgésique de réserve qu'il vous a prescrit jusqu'au prochain horaire de prise de Sevre-Long.

Prenez le médicament exactement au rythme prescrit par le médecin, afin d'être protégé(e) de manière optimale contre la douleur ou sa réapparition. N'attendez pas d'avoir à nouveau des douleurs pour prendre votre médicament.

Traitement de substitution en cas de dépendance aux opioïdes

La dose est soigneusement fixée par votre médecin. Par conséquent, veuillez respecter scrupuleusement ses instructions.

La dose est appropriée lorsqu'aucun signe de sevrage n'apparaît ou que l'on ne ressent pas le besoin de prendre d'autres opioïdes. Si cela n'est pas le cas, veuillez consulter votre médecin.



Si vous avez oublié de prendre les capsules retard Sevre-Long, n'en prenez pas le double le lendemain, mais respectez la dose prescrite, comme à l'accoutumée.

En cas d'interruption du traitement pendant une longue durée, l'accoutumance à Sevre-Long disparaît. Dans ce cas, contactez votre médecin. Ce dernier devra à nouveau établir la dose à prendre lors de la reprise du traitement, sous peine d'un surdosage extrêmement dangereux.

Si l'arrêt du traitement de substitution est prévu, la dose doit être réduite progressivement sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois.

Si vous prenez plus de Sevre-Long que vous ne devriez

Les personnes ayant pris une dose trop importante peuvent développer une pneumonie causée par l'inhalation de vomissements ou de matières étrangères; les symptômes peuvent comprendre un essoufflement, une toux et de la fièvre.

Les personnes ayant pris une dose trop importante peuvent également présenter des difficultés respiratoires entraînant une perte de connaissance ou même le décès.

Un surdosage de Sevre-Long peut déclencher une maladie du cerveau (leucoencéphalopathie toxique).

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Si vous arrêtez d'utiliser Sevre-Long

Ne pas interrompre le traitement par Sevre-Long sans l'accord de votre médecin. Si vous souhaitez interrompre le traitement par Sevre-Long, demandez à votre médecin comment réduire progressivement la dose afin d'éviter l'apparition de symptômes de sevrage.

Les symptômes de sevrage peuvent comprendre les effets suivants: courbatures, tremblements, diarrhée, douleurs abdominales, nausée, symptômes semblables à ceux de la grippe, accélération des battements du cœur et pupilles dilatées.

Les symptômes psychologiques comprennent un sentiment intense d'insatisfaction, de l'anxiété et de l'irritabilité.

Quels effets secondaires Sevre-Long peut-il provoquer?

Une constipation peut survenir très fréquemment lors de l'utilisation de Sevre-Long. On peut la combattre en veillant à avoir une alimentation riche en fibres et à boire en quantité suffisante. Cependant, il est fréquent que le médecin doive prescrire en plus un laxatif.

Traitement de la douleur

Des nausées peuvent survenir très fréquemment et des vomissements fréquemment, en particulier au début du traitement. Si vous présentez des nausées ou des vomissements, informez-en votre médecin, qui pourra vous prescrire un médicament contre ces effets indésirables.

Par ailleurs, la prise de Sevre-Long peut entraîner les effets indésirables ci-après.

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Diminution, voire perte de l'appétit, confusion, insomnie, vertiges, maux de tête, spasmes musculaires involontaires, somnolence sévère jusqu'à étourdissements (sédation), douleurs abdominales, sécheresse de la bouche, sudation, éruption cutanée, démangeaisons, faiblesse, fatigue, malaise.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Réactions d'hypersensibilité, agitation, euphorie, hallucinations, modification de l'humeur, convulsions, tension musculaire accrue, sensation anormale, troubles de la vision, sensation vertigineuse, palpitations, rougeur du visage, chute de la pression artérielle, perte de connaissance (syncope), accumulation d'eau au niveau des poumons (après augmentation rapide de la dose), respiration ralentie et superficielle (dépression respiratoire), altération de la fonction respiratoire, détresse respiratoire, occlusion intestinale, modifications du goût, troubles digestifs, augmentation des valeurs hépatiques, éruption cutanée



prurigineuse (urticaire), rétention urinaire, rétention d'eau (œdèmes).

Les effets secondaires suivants peuvent également survenir à une fréquence indéterminée lors de la prise de Sevre-Long: réactions allergiques sévères entraînant une détresse respiratoire ou des vertiges.

Par ailleurs, des réactions allergiques générales aiguës, des troubles cognitifs, une dépendance aux médicaments, des troubles de l'humeur, des sensations douloureuses liées à des stimuli ne causant généralement aucune douleur (allodynie), une sensibilité excessive à la douleur (hyperalgésie), des arrêts respiratoires périodiques pendant le sommeil (syndrome d'apnées du sommeil), un rétrécissement des pupilles, un ralentissement de la fréquence cardiaque, une atténuation du réflexe de la toux, une perturbation de l'odorat, une inflammation du pancréas, des douleurs ou gênes abdominales de type coliques, des réactions cutanées sévères accompagnées de cloques, d'une peau squameuse étendue, de boutons remplis de pus ainsi que de fièvre, une absence de règles, des troubles de l'érection, une diminution de la libido, une accoutumance au médicament lors de la prise au long cours ou des symptômes de sevrage peuvent survenir.

Veuillez noter qu'une grossesse reste possible malgré l'absence de règles et qu'une contraception efficace est par conséquent nécessaire, même dans ces conditions, pendant toute la durée du traitement par Sevre-Long.

Traitement de substitution en cas de dépendance aux opioïdes

Les effets indésirables le plus souvent observés en rapport avec le traitement de substitution sont énumérés ci-après.

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

Variations de l'humeur, maux de tête, sécheresse de la bouche, constipation, nausées, vomissements, transpiration, symptômes de sevrage.

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Agitation, dépression, troubles du sommeil, vertiges, palpitations, détresse respiratoire, douleurs abdominales, diarrhée, démangeaisons, douleurs au dos, besoin fréquent d'uriner.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Occlusion intestinale.

Surdosage

En cas de suspicion de surdosage, il faut immédiatement informer le médecin, qui prendra les mesures appropriées. Les signes d'un surdosage sont la contraction des pupilles, une inflammation du pancréas, des douleurs ou gênes abdominales de type coliques, des réactions cutanées sévères accompagnées de cloques, d'une peau squameuse étendue, de boutons remplis de pus ainsi que de fièvre (pustulose exanthématique aiguë généralisée, PEAG), des symptômes en relation avec une inflammation du pancréas (pancréatite) et du canal cholédoque, comme des fortes douleurs épigastriques pouvant irradier dans le dos, nausées, vomissements ou fièvre, un ralentissement extrême de la respiration, une tension artérielle faible, un état semblable à une anesthésie. Le principal risque d'un surdosage est une paralysie respiratoire.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Lorsque le traitement est terminé, veuillez rapporter le reste du médicament à l'endroit où il vous a été remis (cabinet médical, pharmacie) afin qu'il soit correctement éliminé.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).



Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Sevre-Long?

Principes actifs

1 capsule retard de Sevre-Long à 30 mg (capsule dure bleu clair, à libération prolongée, de taille 4, portant la mention «MS OD 30») contient 30,00 mg de sulfate de morphine pentahydraté (équivalent à 22,56 mg de morphine).

1 capsule retard de Sevre-Long à 60 mg (capsule dure brun foncé, à libération prolongée, de taille 3, portant la mention «MS OD 60») contient 60,00 mg de sulfate de morphine pentahydraté (équivalent à 45,12 mg de morphine).

1 capsule retard de Sevre-Long à 120 mg (capsule dure de couleur olive, à libération prolongée, de taille 1, portant la mention «MS OD 120») contient 120,00 mg de sulfate de morphine pentahydraté (équivalent à 90,25 mg de morphine).

1 capsule retard de Sevre-Long à 200 mg (capsule dure de couleur rouille, à libération prolongée, de taille 0, portant la mention «MS OD 200») contient 200,00 mg de sulfate de morphine pentahydraté (équivalent à 150,42 mg de morphine).

Excipients

1 capsule retard de Sevre-Long à 30 mg contient les excipients suivants: huile végétale hydrogénée, macrogol 6000, talc, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium (correspondant à 0,006 mg de sodium par capsule), gélatine, gomme-laque, propylène glycol, indigotine (E 132), dioxyde de titane (E 171), oxyde de fer noir (E 172).

1 capsule retard de Sevre-Long à 60 mg contient les excipients suivants: huile végétale hydrogénée, macrogol 6000, talc, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium (correspondant à 0,008 mg de sodium par capsule), gélatine, gomme-laque, propylène glycol, indigotine (E 132), oxyde de fer rouge (E 172), oxyde de fer jaune (E 172), dioxyde de titane (E 171), oxyde de fer noir (E 172).

1 capsule retard de Sevre-Long à 120 mg contient les excipients suivants: huile végétale hydrogénée, macrogol 6000, talc, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium (correspondant à 0,012 mg de sodium par capsule), gélatine, gomme-laque, propylène glycol, indigotine (E 132), oxyde de fer jaune (E 172), dioxyde de titane (E 171), oxyde de fer noir (E 172).

1 capsule retard de Sevre-Long à 200 mg contient les excipients suivants: huile végétale hydrogénée, macrogol 6000, talc, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium (correspondant à 0,015 mg de sodium par capsule), gélatine, gomme-laque, propylène glycol, oxyde de fer rouge (E 172), oxyde de fer jaune (E 172), dioxyde de titane (E 171), oxyde de fer noir (E 172).

Numéro d'autorisation

53952 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Sevre-Long? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.

Sevre-Long 30 mg et 60 mg: emballages de 30 capsules retard.

Sevre-Long 120 mg et 200 mg: emballages de 30 et 100 capsules retard.

Titulaire de l'autorisation

Mundipharma Medical Company, Hamilton/Bermuda, succursale de Bâle.



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

