

Medicamento vegetale da piante

Che cos'è AMAPhyto gocce d'Echinacea e quando si usa?

AMAPhyto gocce Echinacea sono un rimedio da piante fresche di rudbeckia (Echinacea purpurea). Tradizionalmente, possono essere impiegate per aumentare le difese dell'organismo in caso di lievi malattie generali, inoltre per la prevenzione in caso di predisposizione alle malattie da raffreddamento.

Quando non si possono usare le AMAPhyto gocce Echinacea oppure solo con prudenza?

AMAPhyto gocce Echinacea non dovrebbe essere presi in caso di

- malattie evolutive come la tubercolosi, la leucemia (malattia dei globuli bianchi), collagenosi (malattia di tipo infiammatorio sistemico con un'importante componente autoimmune, come il lupus eritematoso sistemico) e sclerosi multipla
- ipersensibilità nota a uno dei costituenti (vedi «Cosa contengono le AMAPhyto gocce Echinacea»)
- allergie note ai componenti, p.es. camomilla, arnica.

In caso di predisposizione ai raffreddamenti nei bambini, è consigliato di consultare un medico. La preparazione non conviene ai neonati.

Informare il suo medico, farmacista o droghiere se soffre d'altre malattie o d'allergie oppure se prende altri medicinali (anche di propria iniziativa!).

Questo medicamento contiene 65% vol. d'alcol. In base alla posologia raccomandata con ogni dose sono assunti fino a 0.61 g (bambini fino a 0.24 g) d'alcol. Sussiste un rischio per la salute tra gli altri per malati di fegato, alcolisti, epilettici, cerebrolesi, donne in gravidanza, donne in allattamento e bambini oltrepassante il dose. L'effetto d'altri medicinali può essere rafforzato o limitato.

Si possono somministrare le AMAPhyto gocce Echinacea durante la gravidanza o l'allattamento?

Sulla base delle esperienze fatte fino ad oggi, e nel caso di un utilizzo appropriato, non è noto nessun rischio per il bambino.

Tuttavia non sono mai stati eseguiti esami scientifici sistematici. Durante la gravidanza e nel periodo dell'allattamento dovrebbe per precauzione rinunciare all'uso di medicinali o chiedere consiglio al suo medico, farmacista o droghiere.

Come usare le AMAPhyto gocce Echinacea?

Adulti in caso di malattia: 3–5 volte al giorno 20–25 gocce con un po'd'acqua,

in caso di predisposizione ai raffreddori: 3 volte al giorno 20 gocce.

Bambini a partire dai 6 anni: 10 gocce.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o alla prescrizione medica.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo poco o troppo ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

La preparazione non dovrebbe essere presa senza interruzione per più di 6 a 8 settimane.

Quali effetti collaterali possono avere le AMAPhyto gocce Echinacea?

In casi molto rari reazioni d'ipersensibilità (ad es. eruzioni cutanee). In questo caso deve interrompere il trattamento e consultare un medico.

Se osserva degli effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo, voglia informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?



A causa del processo di fabbricazione, le AMAPhyto gocce Echinacea contengono 65 vol % d'alcol.

Conservi il prodotto ben chiuso fuori della portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata von «EXP» sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono le AMAPhyto gocce Echinacea?

1 ml di AMAPhyto gocce Echinacea contiene 0.9 ml di tintura da foglia fresca di rudbeckia (Echinacea purpurea) (foglia fresca: tintura: 1:1,5–2,5), agente d'estrazione: etanolo 86% (m/m), 0,1 ml di tintura da radice fresca di rudbeckia (Echinacea purpurea), (foglia fresca: tintura: 1:1,5–2,5), agente d'estrazione: etanolo 86% (m/m).

Contiene 65 vol % d'alcool. 33 gocce corrispondono à 1 ml.

Numero dell'omologazione

63062 (Swissmedic).

Dove è ottenibile AMAPhyto gocce Echinacea? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza ricetta medica.

In bottigliette da 100 ml.

Titolare dell'omologazione

Amavita HealthCare AG, 4704 Niederbipp.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2003 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

