

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit personnellement, vous ne devez pas le donner à une autre personne, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à sa santé. Veuillez conserver cette notice afin de vous y référer ultérieurement.

Differin® Gel

Qu'est-ce que Differin Gel et quand doit-il être utilisé ?

L'utilisation de Differin est réservée aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans.

Differin Gel est un médicament destiné à un usage externe en cas d'acné légère à modérée du visage, de la poitrine et du dos, en présence de comédons, de pustules et de nodules.

Médicament délivré sur ordonnance du médecin.

Quand Differin Gel ne doit-il pas être utilisé ?

N'utilisez jamais Differin Gel :

Si vous êtes allergique à l'adapalène, au méthylparabène, au propylparabène ou à un autre ingrédient, informez-en votre médecin.

Differin ne doit pas être utilisé sur une peau gercée, abîmée, en cas de dermatite et d'eczéma.

En cas de formes sévères d'acné vulgaire et d'autres formes d'acné comme par ex. la chloracné, car l'efficacité et la tolérance n'ont pas été évaluées.

Differin ne doit pas être utilisé si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être.

Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Differin Gel ?

Les femmes en âge de procréer ne doivent utiliser Differin qu'en association avec une méthode de contraception sûre (voir « Differin peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ? »). Differin Gel ne doit pas entrer en contact avec les yeux, la bouche, les narines et les muqueuses. En cas de contact accidentel avec les yeux, il convient de les rincer abondamment à l'eau tiède.

Differin Gel ne doit pas être appliqué sur les plaies ouvertes, l'eczéma et les coups de soleil graves.

Pendant le traitement par Differin, il convient d'éviter toute exposition prolongée au soleil et au rayonnement UV en l'absence d'expériences sur les interactions éventuelles.

L'utilisation simultanée de produits de peeling, de savons et de produits nettoyants agressifs, de substances desséchant la peau, de produits astringents ou irritants ou qui contiennent de l'alcool et du parfum peut aggraver d'éventuelles irritations localisées.

Differin Gel contient :

- Le 4-hydroxybenzoate de méthyle (E218), peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réactions retardées.
- Le propylène glycol peut provoquer des irritations cutanées.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).



Differin Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

N'utilisez pas Differin si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être. Votre médecin pourra vous fournir de plus amples informations. Si vous tombez enceinte au cours du traitement par Differin, interrompez immédiatement le traitement et informez-en votre médecin dès que possible pour mettre en place un nouveau traitement. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode de contraception adaptée pendant le traitement. Parlez à votre médecin de la méthode que vous désirez utiliser. Differin ne doit pas être utilisé pendant la période d'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Comment utiliser Differin Gel ?

Differin Gel est réservé à un usage externe.

Bien nettoyer et bien sécher la peau avant d'appliquer Differin Gel. Differin Gel doit être appliqué manuellement une fois par jour, de préférence avant le coucher.

L'amélioration clinique est visible en 4 à 8 semaines et progresse tout au long du traitement, soit jusqu'à 12 semaines.

La durée d'utilisation doit être déterminée par votre médecin traitant.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Si vous pensez que ce médicament a une action trop forte ou trop faible, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires Differin Gel peut-il provoquer ?

Comme tous les médicaments, Differin peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Differin Gel peut entraîner les effets indésirables suivants au niveau du site d'application.

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Sécheresse de la peau ;

Irritation cutanée ;

Sensation de brûlure ;

Rougeurs (érythème).

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

Réactions localisées (dermatite de contact) ;

Sensations désagréables ;

Coup de soleil ;

Démangeaisons (prurit) ;

Desquamation (exfoliation) ;

Éruption d'acné.

D'autres réactions sont possibles, comme la dermatite allergique (allergie de contact), une douleur ou un gonflement de la peau, ainsi qu'une irritation, des rougeurs, des démangeaisons ou un gonflement des paupières.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Hypo/hyperpigmentation ;

Coloration foncée des peaux claires ;



Blanchiment des peaux plus foncées ;

Réaction semblable à une brûlure au site d'application.

Des réactions semblables à une brûlure au site d'application ont été décrites (en général de nature superficielle, mais des cas semblables à des brûlures du deuxième degré et à des brûlures plus graves ont aussi été signalés).

Réactions allergiques graves, angioedème. Consultez immédiatement un médecin ou un pharmacien si vous observez l'un des symptômes suivants - il se peut qu'un traitement médical d'urgence soit nécessaire : Gonflement du visage, des lèvres ou de la gorge rendant la déglutition ou la respiration difficile, éruption cutanée, démangeaisons, urticaire et sensation de vertige. Ceci peut être le signe d'un angioedème ou d'une réaction allergique grave.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Si vous utilisez des produits cosmétiques comme du maquillage ou du fond de teint, veillez à ce que ces produits soient toujours à base d'eau (à l'exception des poudres) ; les produits hydratants doivent être non gras.

Conservation

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Remarque concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15 à 25 °C).

Tenir hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Veillez rapporter en pharmacie le reste de produit à la fin du traitement en vue de son élimination.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Differin Gel ?

Principes actifs

1 g de gel contient 1 mg d'adapalène (principe actif).

Excipients

4-hydroxybenzoate de méthyle (E218), phénoxyethanol, propylène glycol (E1520), édétate de sodium, carbomère 940, poloxamer 182, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

52867 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Differin Gel ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.



Tubes de 50 g.

Titulaire de l'autorisation

Galderma SA, CH-6300 Zoug

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

