

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fexo-Mepha Allergie 180 mg compresse rivestite con film

Mepha Pharma AG

Che cos'è Fexo-Mepha Allergie 180 mg e quando si usa?

Fexo-Mepha Allergie 180 mg è un antistaminico utilizzato per il trattamento dell'orticaria, una dermatosi allergica, e agisce contro i suoi sintomi come arrossamenti cutanei o prurito.

Quando non si può assumere Fexo-Mepha Allergie 180 mg?

Fexo-Mepha Allergie 180 mg compresse rivestite con film non può essere assunto da persone che presentano un'ipersensibilità già nota a uno dei suoi componenti.

I bambini di età inferiore ai 12 anni non possono assumere Fexo-Mepha Allergie 180 mg.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Fexo-Mepha Allergie 180 mg?

Si consiglia di assumere eventuali preparati antiacidi a base di idrossido di alluminio o di magnesio a distanza di due ore dall'assunzione di Fexo-Mepha Allergie 180 mg.

Prove specifiche (ad es. durante la guida) hanno mostrato che normalmente Fexo-Mepha Allergie 180 mg non compromette le prestazioni e la capacità di concentrazione e non causa stanchezza o sonnolenza più di quanto non faccia un placebo (compressa senza principio attivo). Le persone particolarmente sensibili dovranno tuttavia verificare prima la loro reazione personale a Fexo-Mepha Allergie 180 mg.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Fexo-Mepha Allergie 180 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati condotti studi scientifici sistematici. A titolo precauzionale, durante la gravidanza e l'allattamento bisognerebbe astenersi se possibile dall'assumere medicinali o chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Come usare Fexo-Mepha Allergie 180 mg?

Adulti e giovani a partire dai 12 anni:

Fexo-Mepha Allergie 180 mg: 1 compressa rivestita con film (180 mg) 1 volta al giorno (preferibilmente al mattino).

Le compresse rivestite con film di Fexo-Mepha Allergie 180 mg presentano una linea di frattura e possono essere divise per facilitarne l'assunzione, ma non per aggiustare la dose.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Fexo-Mepha Allergie 180 mg?

In seguito all'assunzione di Fexo-Mepha Allergie 180 mg, possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Mal di testa, sonnolenza, vertigini, nausea. La frequenza degli effetti collaterali osservati con Fexo-Mepha Allergie 180 mg corrisponde a quella osservata durante un trattamento con il placebo (compresse senza principio attivo).

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Diarrea, bocca secca, tachicardia e palpitazioni.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Stanchezza, insonnia, nervosismo, disturbi del sonno oppure incubi, eruzioni cutanee, orticaria e prurito.

In singoli casi sono state segnalate reazioni di ipersensibilità che si manifestano con edemi (accumulo di acqua nei tessuti), difficoltà respiratoria, oppressione al torace, arrossamenti cutanei con sensazione di calore.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale e a temperature non superiori a 30°C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fexo-Mepha Allergie 180 mg?

Principi attivi

Una compressa rivestita con film di Fexo-Mepha Allergie 180 mg contiene 180 mg di fexofenadina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, amido di mais, povidone, magnesio stearato; film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, macrogol 4000, ossido di ferro giallo e rosso (E172).

Numero dell'omologazione

70455 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Fexo-Mepha Allergie 180 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Fexo-Mepha Allergie 180 mg: confezioni da 10, 30 et da 50 compresse rivestite con film con linea di frattura.

Titolare dell'omologazione

Mepha Pharma AG, Basel.



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Numero interno della versione: 2.1

