

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Mucogel, crème

Médicament homéopathique

Quand Mucogel est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Mucogel peut être utilisé en cas de lumbago, sciatique, rhumatisme articulaire et musculaire, contusions et distorsions.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Mucogel peut être utilisé simultanément.

Quand Mucogel ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Peut provoquer des irritations cutanées locales (par exemple une dermatite de contact), des irritations des yeux et des muqueuses.

Ce médicament contient 28,98 mg de propylèneglycol dans 126 mg de crème (unité de dosage de la taille d'un pois), soit 230 mg/1 g.

Mucogel ne doit pas être utilisé en cas de

- Hypersensibilité connue aux moisissures (*Mucor racemosus*)
- Maladies auto-immunes
- Enfants de moins de 12 ans
- Grossesse et allaitement

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Mucogel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Mucogel ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Mucogel?

Sauf prescription contraire du médecin, adultes et adolescents à partir de 12 ans: appliquer 1–3 fois par jour une couche mince sur la partie atteinte ou plus épaisse sur le pansement.



Mucogel ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Mucogel peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Mucogel et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire Mucogel n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « À utiliser jusqu' au » sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Consignes d'élimination

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Que contient Mucogel?

1 g de crème contient:

Principes actifs

Mucor racemosus e volumine cellulae (lyophil., steril.) D3 0.1g HAB 5a

Excipients

Vaseline blanche

Butylhydroxytoluène 0.0000178 g

Alcool cétéarylique 0.0019 g

Alcools de graisse de laine

Triglycérides à chaîne moyenne

Monostéarate de glycérine

Propylèneglycol 0.23 g

Sulfate de magnésium



Acide lactique
eau purifiée

Numéro d'autorisation

50230 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Mucogel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 30 g.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

