

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mucogel, crema

Medicamento omeopatico

Quando si usa Mucogel?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Mucogel può essere usato in caso di lombaggine (colpo della strega), sciatica, reumatismo articolare e muscolare, contusioni e distorsioni. L'uso di questo medicamento si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Mucogel.

Quando non si può usare Mucogel e quando la sua il suo uso richiede prudenza?

Può causare irritazioni cutanee localizzate (ad es. dermatite da contatto), irritazioni agli occhi e alle mucose. Questo medicinale contiene 28,98 mg glicole probilenico per 126 mg (unità di dosaggio della dimensione di un pisello) corrispondenti a 230 mg/1 g.

Mucogel non deve essere utilizzato in caso di

- Ipersensibilità nota alle muffe (*Mucor racemosus*)
- Malattie autoimmuni
- Bambini sotto i 12 anni
- Gravidanza e allattamento

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Mucogel durante la gravidanza o l'allattamento?

Mucogel non deve essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Mucogel?

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti e gli adolescenti a partire dai 12 anni:

Applicare da 1–3 volte al giorno sulle aree cutanee interessate o uno strato alto come la costi di un coltello sulla benda. Mucogel non deve essere usato per bambini sotto i 12 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Quali effetti collaterali può avere Mucogel?

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Mucogel e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Mucogel.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con « verwendbar bis » sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Istruzioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Mucogel?

1 g di crema contiene:

Principi attivi

Mucor racemosus e volumine cellulae (lyophil., steril.) D3 0.1g HAB 5a

Sostanze ausiliarie

Vaselina bianca

Butilidrossitoluene 0.0000178 g

Alcool Cetilstearylco 0.0019 g

Alcool di lanolina

Acidi grassi a catena media

Monostearato di glicerolo

Glicole propilenico 0.23 g

Solfato di magnesio

Acido lattico

acqua purificata



Numero dell'omologazione

50230 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mucogel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 30 g.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

