

Informazioni destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

PROPECIA®

Che cos'è Propecia e quando si usa?

Il suo medico le ha prescritto Propecia in quanto lei è affetto da alopecia ereditaria (detta anche alopecia androgenetica).

Propecia inibisce un importante enzima (la 5-alfa-reduttasi di tipo II), il quale partecipa alla regolazione della crescita dei capelli. Questo meccanismo consente a Propecia di ridurre specificatamente nel cuoio capelluto la concentrazione di diidrotestosterone (DHT), che rappresenta una delle cause principali della calvizie ereditaria. Grazie alla sua azione, Propecia impedisce l'ulteriore perdita di capelli, può favorire la ricrescita dei capelli e invertire il processo che conduce alla calvizie. Uomini affetti da alopecia lieve o moderata, ma non da calvizie completa, possono aspettarsi dei vantaggi dall'uso di Propecia.

Nell'ambito di uno studio condotto sulle donne, Propecia si è rivelato inefficace nel trattamento dell'alopecia ereditaria.

Propecia è indicato unicamente negli uomini e *non* deve essere utilizzato dalle donne e dai bambini.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Cos'è l'alopecia androgenetica maschile?

L'alopecia androgenetica maschile si manifesta con un diradamento progressivo dei capelli, la linea dei capelli svanisce, ci si stempia e si forma una zona calva al centro e alla sommità del capo. Il diidrotestosterone (DHT) accorcia la fase di crescita, determinando così un diradamento dei capelli. Questo processo conduce all'alopecia androgenetica, che inizia intorno ai 20 anni e si accentua con l'età del paziente. Quando la calvizie è presente da lungo tempo, la ricrescita dei capelli nella zona colpita risulta improbabile.

Quando non si può assumere/usare Propecia?

Donne che sono o potrebbero essere in gravidanza non devono utilizzare Propecia (vedi anche "Si può assumere/usare Propecia durante la gravidanza o l'allattamento?").

Non utilizzi Propecia se sospetta un'allergia verso un componente del medicamento.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Propecia?

Propecia non è indicato nell'alopecia non ereditaria. Propecia non è indicato nelle donne e nei bambini.

Informi il suo medico su tutti i problemi di salute presenti o passati e su tutte le allergie di cui soffre. Il suo medico deciderà se lei può o meno assumere Propecia.

Propecia non presenta generalmente alcuna interazione con altri medicinali. Ciò nonostante deve sempre informare il suo medico su tutti i medicinali che assume o che prevede di assumere, anche su quelli che ha ottenuto senza ricetta medica.

Effetti sull'antigene prostatico specifico (PSA)

Propecia può interferire con il test dell'antigene prostatico specifico (PSA) nel sangue, eseguito nell'ambito dello screening per il cancro alla prostata. Se è previsto un test del PSA, è necessario informare il medico o il farmacista dell'assunzione di Propecia, poiché Propecia riduce i livelli di PSA.

Tumore al seno

Se osserva alterazioni nel tessuto della mammella, ad esempio noduli, dolore, ingrossamento o secrezione dai capezzoli, si rivolga immediatamente al suo medico. Queste manifestazioni potrebbero essere il segno



di una grave malattia come il cancro della mammella.

Alterazioni dell'umore e depressione

Nei pazienti trattati con Propecia sono state riferite alterazioni dell'umore quali umore depresso, depressione e, più raramente, idea suicida. Se dovesse notare uno di questi sintomi, interrompa l'assunzione di Propecia e consulti immediatamente il suo medico.

In alcuni pazienti è stata segnalata compromissione della funzione sessuale, che può contribuire ad alterazioni dell'umore, inclusi pensieri suicidi. Se manifesta sintomi di compromissione della funzione sessuale, contatti il medico per ricevere ulteriori consigli. Il medico potrebbe prendere in considerazione l'interruzione del trattamento.

Non esistono evidenze che Propecia influenzi la capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Se sa di avere un'intolleranza allo zucchero, consulti il suo medico prima di prendere Propecia. Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per unità di dosaggio, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie
- o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Propecia durante la gravidanza o l'allattamento?

L'uso di Propecia è indicato solo per gli uomini che presentano alopecia androgenetica. Donne incinte o che potrebbero esserlo non devono assumere il medicamento né manipolare compresse schiacciate o frantumate.

Teoricamente, se il principio attivo venisse assorbito dalla mucosa della bocca o dalla pelle di una donna incinta con feto di sesso maschile, potrebbe svilupparsi una malformazione degli organi genitali del nascituro. La compressa integra è avvolta da un film protettivo che, durante l'impiego normale, impedisce che si abbia un contatto con il principio attivo. In caso di domande si rivolga al suo medico. Non sono disponibili dati sul possibile passaggio della finasteride dallo sperma al feto umano.

L'infertilità è stata segnalata in uomini che avevano assunto finasteride a lungo termine e che presentavano altri fattori di rischio che possono influenzare la fertilità. Dopo l'interruzione della finasteride, è stata riportata una normalizzazione o un miglioramento della ridotta qualità dello sperma. Non sono stati condotti studi clinici a lungo termine concernenti gli effetti della finasteride sulla fertilità negli uomini.

Come usare Propecia?

Assuma una compressa di Propecia al giorno, indipendentemente dai pasti. A tal riguardo segua le indicazioni del suo medico.

Prenda ogni giorno una sola compressa di Propecia, poiché questo medicinale non agisce più velocemente o meglio, se ne assume in maggior quantità.

È importante continuare la terapia con Propecia per tutto il tempo stabilito dal medico. In generale è necessaria una somministrazione quotidiana di almeno tre mesi prima di osservare un arresto della caduta dei capelli o un aumento della ricrescita. Propecia può sviluppare la sua azione solo se è somministrato per lungo tempo e senza interruzione.

I migliori risultati si ottengono con una terapia a lungo termine.

Nel caso avesse ingerito troppe compresse, si metta immediatamente in contatto con il suo medico.

Assuma Propecia come le è stato prescritto dal suo medico. Se un giorno dimentica di prendere una compressa, non ne assuma una in più, ma assuma semplicemente la compressa successiva all'orario abituale.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Propecia?

I seguenti effetti collaterali possono manifestarsi durante l'assunzione di Propecia:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100):

- riduzione della libido (desiderio sessuale), persistente dopo l'interruzione dell'assunzione del medicamento
- difficoltà di erezione

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000):

- riduzione del desiderio sessuale
- disturbi dell'eiaculazione, diminuzione del volume dell'eiaculato (questo fenomeno non sembra comunque compromettere la funzione sessuale normale).

Questi effetti collaterali regrediscono sia negli uomini che interrompono l'assunzione di Propecia, sia in molti uomini che proseguono il trattamento.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000):

- reazioni allergiche, incluse eruzioni cutanee, prurito, orticaria
- gonfiore delle labbra, della lingua, della gola e del viso
- dolore ai testicoli
- sangue nello sperma
- dolore e ingrossamento delle ghiandole mammarie

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

- Cancro al seno negli uomini (vedi anche Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Propecia?)

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- depressione
- ansia
- pensieri suicidi
- problemi di eiaculazione persistenti dopo l'interruzione dell'assunzione del medicamento
- difficoltà persistenti di erezione dopo la sospensione del medicamento
- infertilità maschile e/o di scarsa qualità dello sperma. Un miglioramento della qualità dello sperma dopo l'interruzione del medicamento è stata riportata

Propecia non influisce sulla crescita dei peli in altre regioni del corpo.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare tra 15 e 30 °C. Tenere ben chiuso il contenitore per proteggere il contenuto dall'umidità.

Non consegni le compresse Propecia ad altre persone. Le compresse frantumate o rotte non devono essere maneggiate da donne in età fertile. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni



Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Propecia?

Propecia (finasteride) è una compressa di colore brunoastro, ottagonale, rivestita da un film protettivo.

Principio attivo

1 mg di finasteride

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, carbossimetilamido-sodio (tipo A), sodio docusato, magnesio stearato

Rivestimento della compressa

ipromellosa, idrossipropilcellulosa, diossido di titanio (E171), talco, ossido di ferro giallo e rosso (E172).

Numero dell'omologazione

54322 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Propecia? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 84 compresse rivestite di Propecia da 1 mg.

Titolare dell'omologazione

Organon GmbH, Lucerna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

OG-0906--082023-HMV4-RCN100003224-CH

