

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été prescrit personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

BAQSIMI

Qu'est-ce que BAQSIMI et quand doit-il être utilisé ?

Selon prescription du médecin.

Baqsimi contient le glucagon comme principe actif.

Le glucagon fait partie d'un groupe de médicaments que l'on appelle des hormones pancréatiques. C'est une hormone naturelle qui exerce dans le corps humain une action opposée à celle de l'insuline. Il aide le foie à transformer en glucose (sucre) ce que l'on appelle le «glycogène». Le glucose est ensuite libéré dans la circulation sanguine, ce qui fait augmenter les valeurs de la glycémie.

Baqsimi est utilisé pour le traitement des valeurs de glycémie fortement abaissées (hypoglycémies sévères) chez les patients (adultes, adolescents et enfants âgés de 1 an et plus) ayant un diabète.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si vous présentez un risque d'hypoglycémie sévère, vous devez toujours avoir Baqsimi à portée de main:

- montrez aux membres de votre famille, à vos amis ou à vos collègues l'endroit où vous conservez ce médicament et expliquez-leur quand et comment l'utiliser. Tout retard dans le traitement peut être dangereux. Il est important que votre entourage personnel sache comment utiliser Baqsimi avant que vous en ayez besoin.

Quand BAQSIMI ne doit-il pas être utilisé ?

N'utilisez pas Baqsimi si vous êtes allergique au principe actif, le glucagon, ou à l'un des excipients contenus dans Baqsimi (voir sous «Que contient Baqsimi?») ou si vous souffrez d'une tumeur de la glande surrénale (phéochromocytome).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de BAQSIMI?

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser Baqsimi,

- si vous êtes allergique au glucagon. Les symptômes d'une allergie au glucagon peuvent inclure: des éruptions cutanées, des démangeaisons et un gonflement rapide des tissus dans la région du cou, du visage, de la bouche ou de la gorge, une urticaire et des difficultés à respirer.
- si vous suivez un régime, lors de privation de nourriture;



- si vous avez peu de cortisol ou d'aldostérone dans le sang;
- si vous souffrez d'un abus chronique d'alcool;
- si vous souffrez d'hypoglycémie chronique.

Si vous n'êtes pas certain-e si l'un des points ci-dessus s'applique à votre situation, veuillez en parler avec votre médecin ou avec le personnel soignant avant d'utiliser Baqsimi.

Après avoir utilisé Baqsimi, vous devez manger quelque chose aussi rapidement que possible afin de prévenir une nouvelle forte baisse de la glycémie. Vous prendrez des sucres rapides, par exemple du jus de fruits ou une boisson gazeuse sucrée. D'éventuels problèmes tels qu'un nez bouché ou l'incapacité à dégager les voies nasales ne devraient avoir qu'une influence limitée sur l'augmentation de la glycémie après l'administration nasale de Baqsimi.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Les conséquences d'une glycémie très basse (hypoglycémie) peuvent altérer votre capacité de réaction, votre aptitude à la conduite d'un véhicule ou à l'utilisation de machines.

BAQSIMI peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Avant de commencer le traitement, vous devez annoncer à votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous croyez être enceinte ou prévoyez de l'être.

Adressez-vous à votre médecin si vous allaitez ou si vous souhaitez allaiter.

Comment utiliser BAQSIMI ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin, de votre pharmacien ou du personnel soignant. Vérifiez auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou du personnel soignant en cas de doute.

Expliquez à votre famille, vos amis, vos collègues ou au personnel soignant comment utiliser Baqsimi. Ils auront besoin de savoir comment l'utiliser avant que vous en ayez besoin.

Instructions pour l'utilisation de Baqsimi

1. Retirez le film plastique en tirant sur la bandelette rouge.
2. Ouvrez le couvercle et retirez le dispositif du tube. Attention: n'appuyez sur le piston qu'immédiatement avant l'administration de la dose.

Administration de la dose

1. Maintenez le dispositif entre le pouce et les doigts. Ne purgez pas le dispositif, ne le testez pas avant l'utilisation car il ne contient qu'une seule dose de glucagon et il ne peut pas être réutilisé.



2. Introduisez l'embout doucement dans l'une des narines jusqu'à ce que l'un des doigts touche l'extérieur du nez.
 3. Appuyez sur le piston jusqu'au bout. La dose est entièrement délivrée lorsque la ligne verte sur le piston n'est plus visible.
 4. Si la personne est inconsciente, tournez-la sur le côté pour éviter qu'elle ne s'étouffe.
 5. Après avoir administré la dose, la personne qui a apporté de l'aide doit contacter immédiatement une assistance médicale.
 6. Encouragez la personne à manger quelque chose dès que possible. Un en-cas très sucré empêchera une nouvelle hypoglycémie.
- Pour des instructions détaillées, veuillez lire les instructions pour l'utilisation de Baqsmi.

Si vous avez reçu une quantité de Baqsimi plus importante que vous n'auriez dû

Une dose trop élevée de Baqsmi peut provoquer des nausées et des vomissements. Cela peut aussi augmenter la pression artérielle et la fréquence du pouls.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires BAQSIMI peut-il provoquer ?

Les effets secondaires suivants ont été rapportés:

Très fréquents (concerne plus d'un utilisateur sur 10):

- Nausée
- Vomissements
- Maux de tête
- Nez qui coule
- Nez bouché
- Troubles nasaux
- Éternuements

Fréquents (concerne de 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- Hypertension
- Cœur qui bat rapidement
- Yeux larmoyants
- Yeux qui démangent
- Yeux rouges
- Démangeaison de la peau
- Altération du goût

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans



cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conservez Baqsimi dans son tube scellé par un film plastique jusqu'à l'emploi. N'utilisez pas Baqsimi si vous remarquez que le film plastique a été retiré ou que le tube jaune a déjà été ouvert.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver dans l'emballage d'origine. Examiner périodiquement le tube scellé par un film plastique. Si le tube a été ouvert, remplacer le médicament.

Conserver hors de portée des enfants.

Mention concernant l'élimination

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient BAQSIMI ?

Baqsimi est une poudre blanche contenue dans un dispositif prêt à l'emploi destiné à un usage unique dans le nez.

Principes actifs

Chaque récipient unidose contient 3 mg de glucagon comme principe actif.

Excipients

Bêta-cyclodextrine, dodécylphosphocholine.

Numéro d'autorisation

67465 (Swissmedic)

Où obtenez-vous BAQSIMI ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale.

Boîtes de 1 récipient unidose. Baqsimi est conditionné dans une boîte contenant un dispositif destiné à un usage dans le nez, emballé séparément dans un tube en plastique scellé.

Titulaire de l'autorisation

Future Health Pharma GmbH, 8620 Wetzikon



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Instructions pour l'utilisation


BAQSIMI® 3 mg Poudre nasale en récipient unidose

Glucagon


Veillez lire ENTièrement cette notice d'emballage (information destinée aux patients) et ces instructions pour l'utilisation avant d'utiliser votre Baqsimi.

- Montrez à des personnes de votre entourage où vous conservez Baqsimi et expliquez-leur comment vous utilisez Baqsimi. **Il faut que des personnes de votre entourage sachent comment on administre Baqsimi avant que vous en ayez besoin.**

PRÉPARATION DE LA DOSE



- Retirez le film plastique en tirant sur la bandelette rouge.



- Ouvrez le couvercle et retirez le dispositif du tube.
Attention: n'appuyez sur le piston qu'immédiatement avant l'administration de la dose.

ADMINISTRATION DE LA DOSE



- Maintenez le dispositif entre le pouce et les doigts. **Ne testez pas le dispositif avant l'utilisation.**



- **Introduisez** l'embout doucement dans l'une des narines **jusqu'à ce que l'un des doigts touche l'extérieur du nez.**



- **Appuyez** sur le piston jusqu'au bout. La dose est entièrement délivrée **lorsque la ligne verte sur le piston n'est plus visible.**

APRÈS L'ADMINISTRATION DE LA DOSE

- Retirez la pointe du nez et éliminez le dispositif et le tube.

STOCKAGE ET MANIPULATION

- **Ne retirez le film plastique, n'ouvrez le tube qu'immédiatement avant l'administration.**
- Remplacez Baqsimi avant la date de péremption imprimée sur le tube ou sur la boîte.

