

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cetallerg® Sandoz gocce

Sandoz Pharmaceuticals AG

Che cos'è Cetallerg Sandoz e quando si usa?

Cetallerg Sandoz è un medicamento efficace nel trattamento base di malattie allergiche. La sua azione consiste nel blocco dell'effetto dell'istamina liberata nell'organismo durante le reazioni allergiche. Cetallerg Sandoz si usa negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età per il trattamento di malattie allergiche come il raffreddore da fieno, la rinite allergica, la congiuntivite allergica e l'orticaria cronica (spesso associata a prurito). Possono essere trattati con Cetallerg Sandoz anche i bambini dai 2 ai 6 anni che soffrono di raffreddore da fieno. La durata del trattamento per i bambini con rinite allergica non deve superare le 4 settimane. Cetallerg Sandoz è disponibile sotto forma di compresse rivestite con film o gocce.

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere Cetallerg Sandoz?

Non devono assumere il medicamento i pazienti che presentano ipersensibilità al principio attivo, ad altre sostanze affini o ad uno qualsiasi dei componenti di Cetallerg Sandoz.

Cetallerg Sandoz non dev'essere assunto durante l'allattamento. Le donne in gravidanza possono assumere Cetallerg Sandoz solo su prescrizione medica.

I pazienti con malattia renale allo stadio finale (con un tasso di filtrazione glomerulare (GFR) inferiore a 15 ml/min) non devono assumere Cetallerg Sandoz.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Cetallerg Sandoz?

Non devono essere trattati con Cetallerg Sandoz i bambini al di sotto dei 2 anni. L'eventuale assunzione di Cetallerg Sandoz in concomitanza con teofillina (un principio attivo per il trattamento dell'affanno respiratorio) deve avvenire esclusivamente dopo aver consultato il proprio medico. Cetallerg Sandoz e i preparati contenenti glipizide (una sostanza per il trattamento del diabete) non devono essere assunti contemporaneamente. Si raccomanda di assumere il medicamento a base di glipizide al mattino e Cetallerg Sandoz alla sera.

Gli epilettici devono assumere Cetallerg Sandoz con cautela, perché potrebbe scatenare attacchi convulsivi.

Si raccomanda di usare cautela in caso di assunzione concomitante di Cetallerg Sandoz e calmanti o analgesici.

Si raccomanda inoltre cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchine, in quanto l'assunzione di Cetallerg Sandoz può indurre sonnolenza.

Durante il trattamento con Cetallerg Sandoz si consiglia di non consumare alcolici.

Se deve essere sottoposto a un test allergico, chiedi al suo medico se debba interrompere l'assunzione di Cetallerg Sandoz per alcuni giorni prima del test, poiché questo medicamento potrebbe influenzare il risultato del test allergico.

Nei pazienti con predisposizione alla ritenzione urinaria (per es. in caso di lesione del midollo spinale, ingrossamento della prostata), Cetallerg Sandoz può aumentare il rischio di ritenzione urinaria.

Questo medicamento contiene 125 mg di propilenglicole per 1 ml (= 20 gocce).



Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 1 ml (= 20 gocce), cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Cetallerg Sandoz durante la gravidanza o l'allattamento?

Nei test sugli animali non sono stati osservati effetti indesiderati. Si consiglia tuttavia di non assumere Cetallerg Sandoz – né altri medicinali – durante la gravidanza. Se si assume per errore Cetallerg Sandoz in gravidanza, non si prevedono effetti nocivi per il feto, tuttavia si raccomanda di interrompere immediatamente il trattamento. Se è incinta o se pianifica una gravidanza, ne informi il suo medico. Cetallerg Sandoz non dev'essere assunto durante l'allattamento, in quanto il principio attivo passa nel latte materno.

Come usare Cetallerg Sandoz?

Adulti e bambini dai 6 anni di età

La posologia abituale è di 20 gocce di Cetallerg Sandoz al giorno. Nei bambini dai 6 ai 12 anni di età la dose può essere frazionata in due assunzioni (10 gocce ciascuna, al mattino e alla sera). Qualora dovessero manifestarsi leggeri effetti collaterali (stanchezza, mal di testa, disturbi gastrointestinali) che non si risolvono spontaneamente, è consigliabile frazionare la dose giornaliera anche negli adulti, suddividendola in due somministrazioni da 10 gocce ciascuna, al mattino e alla sera.

Bambini dai 2 ai 6 anni di età

La posologia consigliata è di 5 gocce al mattino e alla sera.

Pazienti con insufficienza renale moderata o grave

I pazienti con compromissione della funzionalità renale (insufficienza renale) possono essere trattati con una dose inferiore di medicamento in base alla gravità della malattia renale, secondo la posologia stabilita dal medico curante.

Le gocce di Cetallerg Sandoz si possono assumere pure o diluite in un bicchiere d'acqua.

Cetallerg Sandoz si può assumere ai pasti o lontano da essi. La durata del trattamento dipende dal tipo, dalla durata e dal decorso dei disturbi, e viene stabilita dal medico. Se dimentica di assumere una dose di Cetallerg Sandoz, continui semplicemente il trattamento. Non assuma una dose doppia per compensare quella dimenticata. In caso di sovradosaggio si rivolga immediatamente al suo medico.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Cetallerg Sandoz?

Con l'assunzione di Cetallerg Sandoz possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 su 100 persone trattate)

Lieve stanchezza, leggero mal di testa, sonnolenza, capogiri, secchezza della bocca, nausea.

Non comune (riguarda da 1 a 10 su 1000 persone trattate)

Disturbi gastrointestinali (p.es. diarrea, dolori addominali), malessere, prurito, eruzione cutanea, agitazione, disturbi della sensibilità cutanea, rinite, faringite, sensazione di debolezza.

Raro (riguarda da 1 a 10 su 10'000 persone trattate)

Reazioni di ipersensibilità, episodi convulsivi, insufficienza circolatoria, danni epatici, orticaria, tachicardia, edema (nonfiore), aumento di peso corporeo, stato confusionale, allucinazioni, insonnia, aggressività,



stanchezza estrema, depressione.

Molto raro (riguarda meno di 1 su 10'000 persone trattate)

Disturbi motori, tremori, tic nervosi, reazioni di fotosensibilità, shock allergico, disturbi della minzione (escrezione urinaria anomala), disturbi della visione e movimento circolare incontrollabile degli occhi, trombocitopenia (ridotto numero di piastrine nel sangue), disgeusia (alterazione del gusto), sincope (svenimento).

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Perdita della memoria (amnesia), disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione, capogiri (sensazione di rotazione o movimento), ritenzione urinaria, aumento dell'appetito, pensieri di suicidio, incubi, dolori articolari, dolori muscolari, eruzione cutanea acuta su tutto il corpo accompagnato da pustole ed epatite, infiammazione dei vasi sanguigni, perdita dell'udito.

Dopo sospensione del trattamento con cetirizina, sono stati segnalati prurito e/o orticaria.

Se riscontra uno di questi effetti collaterali, interrompa l'assunzione di Cetallerg Sandoz e informi il suo medico. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Validità dopo apertura del flacone: 6 mesi.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15–25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cetallerg Sandoz?

Principi attivi

1 ml della soluzione in gocce (= 20 gocce) contiene come principio attivo 10 mg di dicloridrato di cetirizina.

Sostanze ausiliarie

Glicerolo 85%, propilenglicole (E1520), acqua purificata, acetato di sodio triidrato.

1 ml di soluzione contiene 2,53 mg di sodio.

Numero dell'omologazione

56891 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Cetallerg Sandoz? Quali confezioni sono disponibili?

Le confezioni in gocce da 20 ml sono disponibili in farmacia, solo dietro presentazione della prescrizione medica.

Titolare dell'omologazione

Sandoz Pharmaceuticals S.A., Risch; domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

