

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Acyclovir-Mepha 200/400/800, Compresse

Mepha Pharma AG

Che cos'è Acyclovir-Mepha e quando si usa?

Acyclovir-Mepha è un medicamento che agisce contro il virus dell'Herpes. Il principio attivo di Acyclovir-Mepha impedisce la moltiplicazione dei virus erpetici senza interferire nei normali processi metabolici. I virus erpetici provocano la formazione di vescichette sulla pelle e sulle mucose.

Le compresse si assumono per curare eruzioni cutanee estese, lesioni delle mucose, manifestazioni patologiche generali, nonché in caso di Herpes zoster (fuoco di S. Antonio).

Acyclovir-Mepha deve essere usato solo su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico per curare la sua attuale infezione.

La sostanza virostatica contenuta in Acyclovir-Mepha non agisce contro tutti i microorganismi che provocano malattie infettive. L'uso di un virostatico mal scelto o non correttamente dosato può causare complicazioni. Quindi non lo usi mai di sua iniziativa per curare altre malattie o altre persone.

Quando non si può assumere Acyclovir-Mepha?

Acyclovir-Mepha non può essere utilizzato in caso di ipersensibilità nota ai principi attivi aciclovir e valaciclovir o ad una delle sostanze ausiliarie contenute in Acyclovir-Mepha.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Acyclovir-Mepha?

In casi molto rari Acyclovir-Mepha può causare reazioni cutanee gravi. Durante l'assunzione di Acyclovir-Mepha deve prestare attenzione a determinati sintomi per ridurre il rischio di problemi. Possibili sintomi sono: eruzione cutanea disseminata di colore rosso o squamosa con vescicole (che possono contenere pus), noduli sotto la pelle o desquamazione cutanea, sintomi simil-influenzali con eruzione cutanea, febbre, linfonodi gonfi e valori del sangue anormali. Se osserva segni o sintomi di reazioni cutanee gravi, interrompa Acyclovir-Mepha e si rivolga immediatamente al suo medico (vedere «Quali effetti collaterali può avere Acyclovir-Mepha?»).

Se è nota l'esistenza di un disturbo della funzionalità renale, si deve informarne il medico, dato che si dovrà forse adattare la posologia.

In caso d'infezione da virus erpetici nella regione genitale, è consigliabile astenersi da ogni contatto sessuale, dato che altrimenti si potrebbe contagiare il/la partner.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Sostanze ausiliarie

Acyclovir-Mepha 200 mg e 400 mg contengono lattosio come sostanza ausiliaria. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Acyclovir-Mepha 200 mg e 400 mg compresse.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui



- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applichi esternamente.

Si può assumere Acyclovir-Mepha durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Se lei ha in atto o desidera una gravidanza, ne informi il medico. Può assumere Acyclovir-Mepha solo su esplicita autorizzazione del medico.

Durante l'assunzione di Acyclovir-Mepha è sconsigliato allattare.

Come usare Acyclovir-Mepha?

Le compresse si deglutiscono.

Durante il trattamento con le compresse Acyclovir-Mepha si abbia cura di bere a sufficienza.

Salvo diversa prescrizione del medico, le posologie sono le seguenti:

Adulti e bambini dai 2 anni in poi:

5 x al giorno 1 compressa da 200 mg, ogni 4 ore, con una pausa notturna di 8 ore, per almeno 5 giorni.

Bambini sotto i 2 anni:

Metà dose, eventualmente dosi più elevate su prescrizione del medico.

In caso di Herpes zoster (fuoco di S. Antonio):

5 x al giorno 2 compresse da 400 mg per 7 giorni o 5 x al giorno 1 compressa da 800 mg per 7 giorni.

La durata del trattamento sarà stabilita dal suo medico.

In caso di ridotta funzionalità renale, il medico provvederà ad adattare la dose.

Una volta iniziata, una terapia con virostatici dovrebbe essere effettuata per tutta la durata prescritta dal medico. Spesso i sintomi della malattia scompaiono prima che l'infezione sia guarita completamente. Una cessazione prematura del trattamento o una durata insufficiente della cura possono avere come conseguenza un riaccendersi della malattia.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Acyclovir-Mepha?

Con l'assunzione di Acyclovir-Mepha possono manifestarsi gli effetti collaterali indicati di seguito:

Con l'assunzione delle compresse possono verificarsi cefalee e vertigini nonché, in pochi casi, eruzioni cutanee, prurito, orticaria, fotosensibilità della pelle od arrossamento cutaneo, oppure possono insorgere nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.

In rari casi sono stati segnalati disturbi neurologici passeggeri quali tremore, confusione mentale, allucinazioni, depressione, stanchezza, sonnolenza, disturbi del movimento e del linguaggio, convulsioni e perdita di coscienza, questo però soprattutto in pazienti che soffrono d'insufficienza renale.

Raramente è stata segnalata una caduta dei capelli, di cui però non è stata dimostrata con certezza una connessione con il trattamento a base di aciclovir.

In caso di comparsa di dispnea (respiro affannoso), senso di costrizione e dolori al petto, gonfiore del viso, delle labbra, delle palpebre o delle estremità, deve informare subito il medico e continuare a prendere Acyclovir-Mepha solo dietro sue esplicite istruzioni. Molto raramente sono stati osservati dei dolori renali. La preghiamo di informare il suo medico, che in tal caso esaminerà la sua funzione renale.

In casi molto rari sono state segnalate reazioni cutanee gravi. I segni di una reazione cutanea grave includono: eruzione cutanea disseminata di colore rosso o squamosa con vescicole (che possono contenere pus), noduli sotto la pelle o desquamazione cutanea, sintomi simil-influenzali con eruzione



cutanea, febbre, linfonodi gonfi e valori del sangue anormali (compresi quelli dei globuli bianchi). Contatti immediatamente il suo medico se osserva questi sintomi e continui ad assumere Acyclovir-Mepha solo se espressamente indicato dal medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se osserva effetti collaterali qui non descritti.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, al riparo dall'umidità e a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il suo medico o il suo farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Acyclovir-Mepha?

Le compresse contengono 200 mg, 400 mg o 800 mg del principio attivo aciclovir e sostanze ausiliarie per la preparazione di compresse.

Principi attivi

Acyclovir.

Sostanze ausiliarie

Acyclovir-Mepha compresse da 200 mg e 400 mg:

Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), silice colloidale anidra, copovidone, magnesio stearato.

Acyclovir-Mepha compresse da 800 mg:

Cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), silice colloidale anidra, povidone 25, magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

53668 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Acyclovir-Mepha? Quali confezioni sono disponibili?

Acyclovir-Mepha è ottenibile in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica non rinnovabile.

Confezioni

Acyclovir-Mepha 200 mg: confezioni da 25 compresse.

Acyclovir-Mepha 400 mg: confezioni da 30 e 70 compresse.

Acyclovir-Mepha 800 mg: confezioni da 35 compresse.

Titolare dell'omologazione

Mepha Pharma AG, Basel.



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Numero interno della versione: 6.1

