

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Bepanthen MED® Crème

Bayer (Schweiz) AG

Qu'est-ce que Bepanthen MED Crème et quand doit-il être utilisé?

Bepanthen MED Crème a pour principe actif le dexpanthénol. Celui-ci est incorporé dans une émulsion légèrement grasse qui pénètre bien dans la peau.

Dans la peau, le dexpanthénol est transformé en acide pantothénique, vitamine qui favorise la formation ainsi que la régénération de la peau de l'intérieur. La crème produit un effet rafraîchissant et apaisant grâce à son fort pouvoir hydratant.

- Bepanthen MED Crème est utilisé pour le traitement des peaux durement sollicitées et irritées, mais non lésées: en cas de rougeurs et de coup de soleil; en cas de points de pression; en cas de brûlures légères; en cas de zones rêches (p.ex. mains, coudes, pieds).
- en cas de petites lésions et d'écorchures légères.
- pour les soins du nourrisson afin de traiter l'érythème fessier, les irritations et les rougeurs de la peau.
- pour les soins mammaires pendant la période d'allaitement et pour le traitement des lésions du mamelon.

Quand Bepanthen MED Crème ne doit-il pas être pris/utilisé?

Si vous êtes allergique à l'un ou plusieurs des composants de Bepanthen MED Crème, vous ne devez pas utiliser ce produit (voir «Que contient Bepanthen MED Crème ?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Bepanthen MED Crème?

L'alcool cétylique, l'alcool stéarylique et la graisse de laine peuvent provoquer des irritations cutanées locales (p.ex. dermatite de contact).

Ce médicament contient 15 mg de propylène glycol par gramme. Le propylène glycol peut provoquer des irritations cutanées.

Chez les bébés de moins de 4 semaines présentant des plaies ouvertes ou des lésions cutanées ou autres (p.ex. brûlures) étendues, ce médicament ne doit pas être utilisé sans l'avis de votre médecin ou pharmacien.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Bepanthen MED Crème peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Bepanthen MED Crème peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Bepanthen MED Crème?

Sur une peau lésée: Appliquez Bepanthen MED Crème une à plusieurs fois par jour en fonction des besoins.



Pour les soins du nourrisson: à chaque changement de couches, nettoyez soigneusement les fesses et les parties génitales du nourrisson, puis étalez Bepanthen MED Crème.

En cas d'allaitement: appliquez Bepanthen MED Crème sur les mamelons après chaque tétée. Avant chaque nouvelle tétée, éliminez soigneusement tout reste de crème adhérent aux mamelons.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Bepanthen MED Crème peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de l'utilisation de Bepanthen MED Crème:

Des effets secondaires en relation avec l'utilisation de Bepanthen MED Crème n'ont été observés que dans de rares cas. Dans de très rares cas, des réactions cutanées allergiques peuvent survenir. Si vous remarquez des réactions inhabituelles de la peau, informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Conservez le tube bien fermé, à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Bepanthen MED Crème?

Principes actifs

1 g de crème contient 50 mg de dexpanthénol.

Excipients

DL-pantolactone, phénoxyéthanol, potassium cétyl phosphate, alcool cétylique, alcool stéarylique, graisse de laine, myristate d'isopropyle, propylèneglycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée

Numéro d'autorisation

42660 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Bepanthen MED Crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tubes de 30 g et de 100 g.

Titulaire de l'autorisation

Bayer (Schweiz) AG, Zurich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

