

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Bepanthen MED® Crema

Bayer (Schweiz) AG

Che cos'è Bepanthen MED crema e quando si usa?

Bepanthen MED Crema contiene il principio attivo dexpanantenolo in un'emulsione leggermente grassa facilmente assorbibile.

Il principio attivo dexpanantenolo viene convertito in acido pantotenico nella pelle e favorisce la formazione e la rigenerazione della pelle dall'interno. Grazie al suo elevato contenuto di umidità la crema produce un effetto rinfrescante lenitivo.

- Bepanthen MED crema si usa per trattare la pelle irritata e molto stressata ma integra: in caso di arrossamenti e scottature solari; punti di pressione; lievi ustioni; zone di pelle ruvida (ad es. mani, gomiti, piedi).
- in caso di lesioni minori e lievi abrasioni.
- nella cura dei neonati per il trattamento di infiammazioni da pannolino, irritazioni, arrossamenti cutanei.
- per la cura del seno durante l'allattamento e per il trattamento di ferite ai capezzoli.

Quando non si può usare Bepanthen MED crema?

In caso di ipersensibilità a uno o più componenti di Bepanthen crema, il preparato non deve essere usato (cfr. «Cosa contiene Bepanthen MED crema?»).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Bepanthen MED crema?

L'alcool cetilico, l'alcool stearilico e il grasso di lana possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Questo medicamento contiene 15 mg di glicole propilenico. Il glicole propilenico può causare irritazione della pelle.

Non usi questo medicamento nei bambini con meno di 4 settimane di età con ferite aperte o aree estese di pelle danneggiata (come bruciature) senza averne parlato con il medico o il farmacista.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può somministrare/usare Bepanthen MED crema durante la gravidanza o l'allattamento?

Bepanthen MED crema può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Bepanthen MED crema?

In caso di cute lesa: applicare Bepanthen MED crema al bisogno, una o più volte al giorno.

Nella cura dei neonati: ad ogni cambio pannolino, spalmare Bepanthen MED crema sulle natiche e nella regione genitale del bambino dopo aver prima pulito accuratamente queste zone.

Durante l'allattamento: applicare Bepanthen MED Crema sui capezzoli dopo ogni poppata. Prima di attaccare nuovamente il bambino al seno, rimuovere con cura tutta la crema dai capezzoli.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Bepanthen MED crema?

Con l'uso di Bepanthen MED crema possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

finora con l'uso di Bepanthen MED crema, solo raramente sono stati riportati effetti collaterali. Molto raramente possono comparire reazioni allergiche. Se dovesse notare reazioni cutanee insolite, informi il suo medico o il suo farmacista.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare il tubo sempre ben chiuso, a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Bepanthen MED crema?

Principi attivi

1 g di crema contiene 50 mg di dexpantenolo.

Sostanze ausiliarie

DL-pantolattone, fenossietanolo, potassio cetil fosfato, alcool cetilico, alcool stearilico, cera di lana, isopropil miristato, glicole propilenico, idrossido di potassio, acqua depurata

Numero dell'omologazione

42660 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Bepanthen MED crema? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubi da 30 g e 100 g.

Titolare dell'omologazione

Bayer (Schweiz) AG, Zurigo.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

