

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Sanukehl® Pseu D6, gouttes

Médicament homéopathique

Quand Sanukehl® Pseu D6, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Sanukehl® Pseu D6, gouttes peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de cystite bactérienne, pyélite.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Sanukehl® Pseu D6, gouttes peut être utilisé simultanément.

Quand Sanukehl® Pseu D6, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Les expériences documentées sur l'utilisation de Sanukehl® Pseu D6, gouttes chez les enfants et les adolescents sont insuffisantes. L'utilisation n'est donc pas recommandée chez les enfants et les adolescents de moins de 12 ans.

. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Sanukehl® Pseu D6, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Sanukehl® Pseu D6, gouttes?

Sauf prescription contraire du médecin pour les adultes et les adolescents de plus de 12 ans: Dans des cas aigus, prendre 5-10 gouttes toutes les 12-24 heures avant un repas.

Dans les cas chroniques, prendre 10 gouttes tous les 2 jours avant un repas.

Sanukehl® Pseu D6, gouttes peut aussi être frictionné dans la peau, dans ce cas, frictionner 5-10 gouttes sur la partie atteinte ou le pli du coude tous les 1-2 jours. L'utilisation et la sécurité de Sanukehl® Pseu D6, gouttes n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 12 ans. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.



Quels effets secondaires Sanukehl® Pseu D6, gouttes peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Sanukehl® Pseu D6, gouttes n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Sanukehl® Pseu D6, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «a utiliser jusqu'à . . .» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre pharmacien.

Que contient Sanukehl® Pseu D6, gouttes?

1 ml de solution contient:

1 ml Pseudomonas aeruginosa D6 aquos. dilutio conformément à la prescription 5a HAB.

Numéro d'autorisation

55550 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Sanukehl® Pseu D6, gouttes? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2002 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

