

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sanukehl® Pseu D6, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Sanukehl® Pseu D6, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Sanukehl® Pseu D6, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di cistite batterica, pielite.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Sanukehl® Pseu D6, gocce.

Quando non si può usare Sanukehl® Pseu D6, gocce e quando il suo uso richiede prudenza?

Non sono disponibili sufficienti esperienze documentate sull'assunzione di Sanukehl® Pseu D6, gocce nei bambini sotto i 12 anni. Pertanto, si sconsiglia l'uso nei bambini di età inferiore rispettivamente ai 12 anni. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Sanukehl® Pseu D6, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad usare medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Sanukehl® Pseu D6, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica negli adulti e adolescenti oltre i 12 anni:

In casi acuti prendere 5–10 gocce ogni 12–24 ore prima di un pasto, in casi cronici, 10 gocce ogni 2 giorni prima di un pasto.

Sanukehl® Pseu D6, gocce può anche essere frizionato sulla pelle, in questo caso, frizionare 5–10 gocce sulla parte colpita o al di sopra del gomito, ogni 1–2 giorni. L'uso e la sicurezza dell Sanukehl® Pseu D6, gocce nei bambini e negli adolescenti sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Sanukehl® Pseu D6, gocce?



Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Sanukehl® Pseu D6, gocce. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'uso di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Sanukehl® Pseu D6, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sanukehl® Pseu D6 gocce?

1 mL di soluzione contiene:

Pseudomonas aeruginosa D6 aquos. dilutio secondo prescrizione 5a HAB.

Numero dell'omologazione

55550 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Sanukehl® Pseu D6 gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione me dica.

Confezione da 10 mL.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

