

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Voies digestives, globules

Médicament homéopathique

Quand *SIMILASAN Voies digestives* est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN Voies digestives* peut être utilisé en cas de **Inflammations des voies digestives, avec:** Nausées, vomissements, diarrhées; Douleurs convulsives (coliques); Manque d'appétit ou dégoût de la nourriture; Etat d'épuisement ou nervosité; Renvois aigres, abdomen ballonné et douloureux au toucher; **Gastro-entérites aiguës, avec:** Diarrhées fortement nauséabondes, mousseuses ou liquides, irritantes; Crampes et faux besoin d'aller à la selle; Vomissements; **Troubles digestifs après absorption de:** Boissons ou mets froids (glaces); Mets acidulés, fruits à pépins ou à teneur élevée en eau; Aliments mal supportés.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si *SIMILASAN Voies digestives* peut être pris simultanément.

Quand *SIMILASAN Voies digestives* ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Les troubles de la digestion des enfants de moins de 12 ans doivent faire l'objet d'une exploration médicale. Pour cette raison, cette préparation ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 12 ans sans exploration médicale préalable.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

***SIMILASAN Voies digestives* peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.



Comment utiliser **SIMILASAN Voies digestives**?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adolescents à partir de 12 ans et adultes: 7 globules par prise.

- **Troubles aigus:** Tous les quarts ou toutes les demi-heures. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- **Troubles légers et pour parachever la guérison:** 3 - 6 fois par jour.

Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

SIMILASAN Troubles des Voies digestives ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans sans avis médical.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre.

C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste

Quels effets secondaires **SIMILASAN Voies digestives** peut-il provoquer ?

Une augmentation de la salivation peut survenir après utilisation; *SIMILASAN Voies digestives* doit alors être arrêté.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN Voies digestives* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Voies digestives* ?

1 g de globules contient:

Principes actifs

Arsenicum album (Ph.Eur. Hom.) D6 (Ph.Eur.Hom. 3.1.1) 2.5 mg; Psychotria ipecacuanha (HAB) D6 2.5 mg; Hydrargyrum bichloratum (HAB) D6 (Ph.Eur.Hom. 3.1.1) 2.5 mg; Podophyllum peltatum (HAB) D6 2.5 mg

Excipients

Xylite (E 967) 600 mg ; carbonate de calcium 400 mg

1 g correspond à 70-90 globules.

Numéro d'autorisation

50868 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN Voies digestives*? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

