

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Sanukehl® Prot D7, solution injectable

Médicament homéopathique

Quand Sanukehl® Prot D7, solution injectable est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Sanukehl® Prot D7, solution injectable peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de pyélite et de pyélonéphrite.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Sanukehl® Prot D7, solution injectable peut être utilisé simultanément.

Quand Sanukehl® Prot D7, solution injectable ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Les expériences documentées sur l'utilisation de la solution injectable Sanukehl Prot D7 chez les enfants et les adolescents sont insuffisantes. L'utilisation n'est donc pas recommandée chez les enfants et les adolescents. Aucune précaution particulière n'est requise dans le cadre d'une utilisation conforme. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Sanukehl® Prot D7, solution injectable peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à utiliser des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Sanukehl® Prot D7, solution injectable?

Posologie / mode d'emploi chez l'adulte:

Injecter 1 ampoule à 1 mL 1-3 fois par semaine par voie sous-cutanée. L'utilisation et la sécurité de Sanukehl Prot D7, solution injectable ne sont pas encore étudiées chez les enfants et les adolescents. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Sanukehl® Prot D7, solution injectable peut-il provoquer?



L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Sanukehl® Prot D7, solution injectable et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Sanukehl® Prot D7, solution injectable?

Proteus vulgaris D7 aquos. dilutio (HAB, 5b, 11).

Cette préparation contient en outre de l'eau et du chlorure de sodium comme excipients.

Numéro d'autorisation

53065 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Sanukehl® Prot D7, solution injectable? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 1, 10 et 50 ampoules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2005 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

