

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Afenadin

NOBEL Pharma Schweiz AG

Che cos'è Afenadin e quando si usa?

Afenadin è un antistaminico.

Viene utilizzato per il trattamento della febbre da fieno ed è efficace contro i suoi sintomi, quali starnuti, bruciore, lacrimazione o arrossamento degli occhi, irritazione della mucosa nasale o della gola e congestione nasale.

Quando non si può assumere Afenadin?

Afenadin compresse pellicolate non può essere assunto da persone che presentano un'ipersensibilità già nota a uno dei suoi componenti.

I bambini di età inferiore ai 12 anni non possono assumere Afenadin.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Afenadin?

Si consiglia di assumere eventuali preparati antiacidi a base di idrossido di alluminio o di magnesio a distanza di due ore dall'assunzione di Afenadin.

Prove specifiche (ad es. durante la guida) hanno mostrato che normalmente Afenadin ha un effetto minimo sulle prestazioni e sulla concentrazione e non rende particolarmente stanchi o assonnati, proprio come un placebo (compressa senza principio attivo). Le persone particolarmente sensibili dovranno tuttavia verificare prima la loro reazione personale a Afenadin.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa pellicolata, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Afenadin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora stati condotti studi scientifici sistematici. A titolo precauzionale, durante la gravidanza e l'allattamento bisognerebbe astenersi se possibile dall'assumere medicinali o chiedere consiglio al medico, al farmacista o al droghiere.

Come usare Afenadin?

Adulti e giovani a partire dai 12 anni:

1 compressa pellicolata (120 mg) 1 volta al giorno (preferibilmente al mattino).

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Quali effetti collaterali può avere Afenadin?

In seguito all'assunzione di Afenadin, possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Mal di testa, sonnolenza, vertigini, nausea. La frequenza degli effetti collaterali osservati con il principio attivo di Afenadin corrisponde a quella osservata durante un trattamento con il placebo (compresse senza principio attivo).

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Diarrea, bocca secca, tachicardia e palpitazioni.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Stanchezza, insonnia, nervosismo, disturbi del sonno oppure incubi, eruzioni cutanee, orticaria e sensazione di prurito.

In casi rari sono state segnalate reazioni di ipersensibilità che si manifestano con edemi (accumulo di acqua nei tessuti), dispnee, oppressione al torace, arrossamenti cutanei con sensazione di calore.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperature superiori a 25 °C, nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Afenadin?

Principi attivi

Una compressa pellicolata Afenadin contiene 120 mg di fexofenadina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460i), amido pregelatinizzato, croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E470b).

Pellicola: ipromellosa (E464), biossido di titanio (E171), macrogol 400 (E1521), povidone (E1201), silicio colloidale anidro (E551), ossido di ferro giallo (E172iii), ossido di ferro rosso (E172ii).

Numero dell'omologazione

69487 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Afenadin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Afenadin: 10 e 30 compresse pellicolate.

Titolare dell'omologazione

NOBEL Pharma Schweiz AG, Risch.



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

