

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Liposic®

Bausch & Lomb Swiss AG

Qu'est-ce que Liposic Gel ophtalmique et quand est-il utilisé?

Liposic gel ophtalmique est une préparation de larmes artificielles. Il est utilisé pour assurer une bonne humidification oculaire et en cas d'irritation oculaire légère. Liposic gel ophtalmique est également utilisé sur recommandation du pharmacien ou du droguiste, ou sur prescription du médecin, en cas de sécheresse oculaire d'origine diverse.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste dans le but de traiter les troubles oculaires dont vous souffrez actuellement. Ne l'utilisez pas de votre propre initiative pour le traitement d'autres maladies ou d'autres personnes. Conseils aux porteurs de lentilles de contact Liposic gel ophtalmique n'est pas recommandé pour les porteurs de lentilles de contact.

Quand Liposic Gel ophtalmique ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'hypersensibilité (allergie) connue ou supposée à l'un des composants de Liposic gel ophtalmique.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Liposic Gel ophtalmique?

S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 2–3 jours, il faut consulter un médecin. En cas d'aggravation ou d'apparition de nouveaux symptômes (par exemple diminution de l'acuité visuelle), il faut immédiatement consulter un médecin.

L'utilisation n'a pas fait l'objet d'études cliniques jusqu'ici chez l'enfant et l'adolescent. C'est pourquoi une telle utilisation est déconseillée.

La vision peut être trouble pendant quelques minutes après l'instillation. Dans ce cas, vous devez renoncer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines jusqu'à normalisation de la vision.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe dans l'oeil (même en automédication)!

Liposic Gel ophtalmique peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

N'utilisez ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement qu'après avoir consulté votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Comment utiliser Liposic Gel ophtalmique?

Adultes: instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival de l'oeil considéré, 3 à 5 fois par jour ou plus souvent, de même qu'avant le coucher. L'utilisation n'a pas fait l'objet d'études cliniques jusqu'ici chez l'enfant et l'adolescent. C'est pourquoi une telle utilisation est déconseillée.

Liposic gel ophtalmique est indiqué pour un traitement à long terme. Cependant, un traitement de ce type doit être mené sous surveillance médicale.

Si vous utilisez encore d'autres préparations ophtalmiques, il convient de respecter un intervalle d'au moins 15 minutes entre les administrations des divers médicaments dans l'oeil; dans le cas d'un traitement simultané par une pommade ophtalmique, cet intervalle doit être de 15 minutes. Liposic gel ophtalmique est susceptible de prolonger le temps de contact d'autres collyres avec la surface de l'oeil et ainsi de renforcer leur effet. Afin d'éviter cet inconvénient, Liposic gel ophtalmique doit toujours être administré en



dernier.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Liposic Gel ophtalmique peut-il provoquer?

L'utilisation de Liposic gel ophtalmique peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Vision floue jusqu'à ce que Liposic se répartisse uniformément sur la surface de l'œil.

Réaction d'hypersensibilité à l'un des composants.

Liposic gel ophtalmique contient du cétrimide, qui peut provoquer – particulièrement lors d'une utilisation fréquente et prolongée – des irritations de l'œil (sensation de brûlure, rougeur, sensation de corps étranger) ainsi que des lésions de l'épithélium cornéen. Si des réactions allergiques ou des irritations oculaires devaient survenir, veuillez cesser l'utilisation de ce médicament et consulter votre médecin. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Ne pas utiliser plus de 4 semaines après l'ouverture du tube. Refermer le tube immédiatement après l'utilisation.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Instructions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine à température ambiante (15-25 °C) et hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour préserver la stérilité du gel ophtalmique, l'extrémité du tube ne doit être mise en contact ni avec les mains ni avec les yeux.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Liposic Gel ophtalmique?

1 g de gel ophtalmique contient:

Principe actif: 2 mg de carbomère 980.

Excipients: cétrimide triglycérides à chaîne moyenne, sorbitol, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Numéro d'autorisation

58179 (Swissmedic).



Où obtenez-vous Liposic Gel ophtalmique? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Liposic gel ophtalmique est disponible dans des emballages de 1 ou 3 tubes de 10 g.

Titulaire de l'autorisation

Bausch & Lomb Swiss SA, 6301 Zug.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

