

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista (o del suo droghiere). Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Liposic®

Bausch & Lomb Swiss AG

Che cos'è Liposic Gel oftalmico e quando si usa?

Liposic Gel oftalmico è un liquido lacrimale artificiale, impiegato per l'umidificazione degli occhi e in caso di lievi irritazioni dell'occhio. Su consiglio del farmacista o del droghiere o su prescrizione medica, Liposic Gel oftalmico è impiegato anche in caso di secchezza degli occhi di varia origine.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato consigliato o prescritto per il trattamento dei suoi attuali disturbi oculari dal suo medico, dal suo farmacista o dal suo droghiere. Non lo usi per il trattamento di altre malattie e non lo passi ad altre persone.

Avvertenze per portatori di lenti a contatto:

Liposic Gel oftalmico non è adatto per portatori di lenti a contatto.

Quando non si può usare Liposic Gel oftalmico?

Nel caso di ipersensibilità (allergia) nota o presunta verso uno dei componenti di Liposic Gel oftalmico.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Liposic Gel oftalmico?

Nel caso in cui dopo 2-3 giorni non si fosse verificato alcun miglioramento, occorre consultare un medico. Se si verificasse un peggioramento o se comparissero nuovi disturbi, quali per es. una diminuzione dell'acuità visiva, va immediatamente consultato un medico.

L'uso nei bambini e negli adolescenti finora non è stato studiato clinicamente ed è quindi sconsigliato.

Per breve tempo dopo l'applicazione la visione può apparire indistinta. In questo caso, si astenga dal condurre veicoli o dall'utilizzare macchine fino alla normalizzazione della visione.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui: soffra di altre malattie, soffra di allergie o, assuma o applichi nell'occhio altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Liposic Gel oftalmico durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza e il periodo dell'allattamento, impiegare il prodotto soltanto dopo aver consultato il medico, il farmacista o il droghiere.

Come usare Liposic Gel oftalmico?

Adulti: 3 - 5 volte o più frequentemente durante la giornata e prima di coricarsi instillare 1 goccia nel sacco congiuntivale dell'occhio interessato. L'impiego nei *bambini e negli adolescenti* finora non è stato studiato clinicamente. Pertanto se ne sconsiglia l'uso in questa fascia d'età.

Liposic Gel oftalmico è adatto per la terapia di lunga durata. Pertanto, una terapia di lunga durata va gestita da un medico.

Qualora impiegasse anche altri preparati oftalmici, tra le applicazioni dei preparati dovrà trascorrere un periodo di almeno 15 minuti; nel caso di un trattamento associato con una crema oftalmica l'intervallo da osservare è 15 minuti. Liposic Gel oftalmico può prolungare il tempo di permanenza di altre gocce oftalmiche nell'occhio e pertanto ne può rafforzare l'azione. Per impedire ciò, si consiglia di adoperare Liposic Gel oftalmico come ultimo preparato.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Liposic Gel oftalmico?

Con l'uso di Liposic gel oftalmico possono comparire i seguenti effetti collaterali:

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Visione offuscata fino alla distribuzione uniforme di Liposic sulla superficie dell'occhio.

Reazione di ipersensibilità a uno dei componenti.

Liposic gel oftalmico contiene cetrimide, che, in particolare nell'uso frequente, può provocare irritazioni dell'occhio (bruciore, arrossamento, sensazione di corpo estraneo) e danneggiare l'epitelio della cornea. Se dovessero comparire reazioni d'ipersensibilità o irritazioni dell'occhio, interrompa il trattamento e consulti il suo medico. Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura utilizzare entro 4 settimane. Chiudere bene il tubo subito dopo l'uso.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Per preservare la sterilità del gel oftalmico, non toccare la punta del contagocce con le mani o con l'occhio.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Liposic Gel oftalmico?

1 g di gel oftalmico contiene:

Principio attivo: 2 mg di carbomero 980;

Sostanze ausiliarie: cetrimide; trigliceridi a catena media, sorbitolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

58179 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Liposic Gel oftalmico? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Liposic Gel oftalmico è disponibile in confezioni da 1 o 3 tubetti da 10 g.



Titolare dell'omologazione

Bausch & Lomb Swiss AG, 6301 Zug.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

