

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Octenisept® incolore

Qu'est-ce que Octenisept® incolore et quand doit-il être utilisé ?

Octenisept incolore est un désinfectant destiné à une application sur la peau et les muqueuses. Il tue les bactéries et les champignons et est également efficace contre les virus.

Octenisept incolore est utilisé pour désinfecter la peau et les muqueuses en cas de blessures et de plaies mineures telles que des coupures, des gerçures, des éraflures ou des brûlures mineures (brûlures au 1^{er} degré). Octenisept incolore est également utilisé pour la désinfection des muqueuses buccales et avant la pose d'un cathéter dans l'urètre. L'application d'Octenisept incolore est indolore.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Les plaies importantes, très sales et profondes ainsi que les morsures et les coupures profondes nécessitent un traitement médical (risque de tétanos). Si l'étendue d'une plaie reste inchangée pendant un certain temps ou si la plaie ne guérit pas dans les 10 à 14 jours, il est également nécessaire de consulter un médecin. Il en va de même si les bords de la plaie sont très rouges, si la plaie enfle soudainement, si elle est très douloureuse ou si la blessure est accompagnée de fièvre (risque de septicémie).

Quand Octenisept® incolore ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas utiliser Octenisept incolore si vous êtes allergique à l'un de ses composants.

Octenisept incolore ne doit pas être utilisé dans l'oreille ni sur l'œil. Ne pas l'utiliser pour rincer la cavité abdominale ou la vessie.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Octenisept® incolore ?

Octenisept incolore ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée sans surveillance médicale. Ne pas l'ingérer. Octenisept incolore est destiné à un usage externe uniquement.

Après le rinçage de plaies profondes à l'aide d'une seringue, l'apparition de dommages tissulaires a été signalée. Par conséquent, Octenisept incolore ne doit être appliqué que superficiellement, c'est-à-dire à l'aide d'une compresse ou par pulvérisation.

Ne pas utiliser Octenisept incolore sur ou à proximité de zones cutanées qui ont été traitées avec des désinfectants à base de povidone iodée. Cela peut entraîner une forte coloration brune à violette dans les zones limites.

L'application doit avoir lieu avec prudence et sous surveillance médicale chez les prématurés de poids extrêmement faible à la naissance (moins de 1000 g). Octenisept incolore peut provoquer des lésions cutanées graves dans ce groupe d'âge.



Retirer l'excès de médicament et veiller à ce que la solution ne reste pas sur la peau (y compris les matériaux humidifiés par la solution en contact direct avec le patient) plus longtemps que nécessaire. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication !).

Octenisept® incolore peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

L'expérience de l'utilisation chez les femmes enceintes est limitée. Le médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse. Comme aucune expérience n'est disponible pour les 3 premiers mois de la grossesse, Octenisept incolore ne doit pas être utilisé pendant les 3 premiers mois de la grossesse. L'expérience relative à une utilisation pendant l'allaitement est insuffisante. Comme le principe actif n'est pas absorbé par la peau ou ne l'est qu'en très petites quantités, on peut supposer qu'elle ne passe pas dans le lait maternel. Si nécessaire, Octenisept incolore peut être utilisé pendant l'allaitement. Pour éviter que le nourrisson n'entre en contact avec les zones cutanées traitées, Octenisept incolore ne doit pas être appliqué sur le sein pendant l'allaitement.

Comment utiliser Octenisept® incolore ?

Sauf autre indication médicale, appliquer Octenisept incolore sur le site à traiter, en fonction des besoins, à l'aide d'un tampon imbibé de produit ou, en cas d'utilisation du spray, vaporiser jusqu'à ce que le site concerné soit entièrement mouillé. Laisser agir 1 minute et laisser sécher.

Octenisept incolore ne doit être utilisé que superficiellement et ne doit pas être injecté en profondeur dans les tissus (voir «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Octenisept incolore?»).

Pour le rinçage de la cavité buccale, rincer intensivement avec environ 20 ml d'Octenisept incolore pendant 20 secondes, puis recracher.

Octenisept incolore peut être utilisé sur les adultes, les enfants et les nourrissons.

Respectez le dosage indiqué dans la notice ou prescrit par votre médecin. Si vous pensez que le médicament agit trop peu ou trop fortement, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Octenisept® incolore peut-il provoquer ?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de l'utilisation d'Octenisept incolore: il peut y avoir une sensation temporaire de brûlure, de rougeur, de démangeaison ou de chaleur sur la peau. Lors du rinçage de la cavité buccale, un goût amer apparaît temporairement. Une sensation de brûlure, d'âpreté ou des troubles du goût peuvent survenir en cas d'application sur la muqueuse buccale.

Si vous remarquez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci s'applique notamment aux effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants.



Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ces personnes disposent d'informations spécialisées détaillées.

Que contient Octenisept® incolore ?

Principes actifs

1 ml de solution à appliquer sur la peau contient 1 mg de dihydrochlorure d'octénidine.

Excipients

Phénoxyéthanol, glycérol, bétaine de cocamidopropyle, chlorure de sodium, gluconate de sodium, hydroxyde de sodium et eau purifiée.

Numéro d'autorisation

49853 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Octenisept® incolore ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

Dans les pharmacies et les drogueries, sans ordonnance médicale. Il existe des flacons pulvérisateurs de 50 ml et 100 ml et des flacons avec bouchon à charnière de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Schülke & Mayr AG, Frauenfeld

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

