

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gaviscon Mint, comprimés à croquer / Gaviscon Fraise, comprimés à croquer

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG

Qu'est-ce que Gaviscon et quand doit-il être utilisé?

Gaviscon est utilisé pour le traitement des brûlures d'estomac et des régurgitations acides (aigreurs). L'alginat de sodium contenu dans Gaviscon forme un gel visqueux qui se dépose rapidement et efficacement au-dessus du contenu gastrique, formant ainsi une barrière contre les régurgitations acides (aigreurs).

Le bicarbonate de sodium et le carbonate de calcium neutralisent une partie de l'excès d'acidité gastrique. Les symptômes provoqués par l'hyperacidité gastrique peuvent ainsi être éliminés pendant quatre heures au maximum.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Gaviscon contient du calcium. Veuillez demander conseil à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous devez suivre un régime pauvre en calcium.

Quand Gaviscon ne doit-il pas être pris?

Si vous êtes hypersensible (allergique) à l'alginat de sodium, au bicarbonate de sodium et au carbonate de calcium ou à l'un des autres composants de Gaviscon.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Gaviscon?

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez ou avez souffert de maladies du rein ou du cœur, car certains sels peuvent influencer ces maladies; si les symptômes persistent encore après 7 jours.

Un intervalle de deux heures doit être respecté entre la prise de Gaviscon et d'autres médicaments afin de ne pas compromettre leur efficacité.

Un comprimé à croquer de Gaviscon Mint contient 3,75 mg d'aspartame. Un comprimé à croquer de Gaviscon Fraise contient 8,8 mg d'aspartame. L'aspartame contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

Gaviscon Mint, comprimés à croquer contiennent 63,16 mg de sodium, Gaviscon Fraise, comprimés à croquer contiennent 63,71 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par comprimé à croquer. Cela équivaut à 3,2% de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.

Parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous avez besoin de 6 comprimés à croquer ou plus quotidiennement pendant une période prolongée, surtout si vous devez suivre un régime à faible teneur en sel (sodium).

Gaviscon Mint, comprimé à croquer contient du dioxyde de soufre (E220), qui peut, dans de rares cas, provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères et des bronchospasmes.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,



- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Gaviscon peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Vous pouvez prendre ce médicament si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous avez des questions relatives à la prise durant la grossesse, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Comment utiliser Gaviscon?

Adultes et adolescents de 12 ans et plus:

En cas de symptômes, prenez 2-4 comprimés à croquer après les repas et avant le coucher, jusqu'à 4 fois par jour. Mâcher soigneusement les comprimés à croquer avant de les avaler.

Vous devez consulter votre médecin si les symptômes ne s'améliorent pas après sept jours.

Gaviscon n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Gaviscon peut-il provoquer?

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)

Des réactions allergiques à l'un des composants peuvent se produire dans de très rares cas. Celles-ci peuvent se manifester par des éruptions cutanées, des démangeaisons, des difficultés respiratoires, des sensations de vertige ou des gonflements du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver dans l'emballage d'origine. Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Gaviscon Mint, comprimés à croquer: Ne pas conserver au-dessus de 30°C.

Gaviscon Fraise, comprimés à croquer: Ne pas conserver au-dessus de 25°C.

Remarques complémentaires

Le médicament ne doit pas être jeté avec les eaux usées ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste comment éliminer le médicament lorsque vous ne l'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Gaviscon?

Comment se présente Gaviscon comprimés à croquer:



Gaviscon Mint: comprimé à croquer blanc cassé à crème, légèrement marbré, à l'arôme de menthe poivrée.

Gravure sur la face supérieure: épée dans un cercle.

Gravure sur la face inférieure: G250.

Gaviscon Fraise: comprimé à croquer de couleur rose pâle, rond, plat à bord biseauté, à l'arôme de fraise.

Gravure sur la face supérieure: épée dans un cercle.

Gravure sur la face inférieure: GS250.

Principes actifs

Gaviscon Mint, comprimés à croquer / Gaviscon Fraise, comprimés à croquer:

250 mg d'alginate de sodium, 133,5 mg de bicarbonate de sodium et 80 mg de carbonate de calcium par comprimé à croquer.

Excipients

Gaviscon Mint, comprimés à croquer: mannitol (E421), macrogol 20 000, stéarate de magnésium, copovidone, aspartame (E951) (3,75 mg/comprimé à croquer), acésulfame potassique (E950), arôme de menthe poivrée (contient du dioxyde de soufre (E220)).

Contient au total 63,16 mg de sodium par comprimé à croquer.

Gaviscon Fraise, comprimés à croquer: xylitol (E967) (contient de la carmellose sodique), mannitol (E421), macrogol 20 000, aspartame (E951) (8,8 mg/comprimé à croquer), stéarate de magnésium, oxyde de fer rouge (E172), arôme de fraise.

Contient au total 63,71 mg de sodium par comprimé à croquer.

Numéro d'autorisation

62889 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Gaviscon? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Gaviscon Mint, comprimés à croquer: emballages de 8, 16, 32, 48, ou 64 comprimés à croquer.

Gaviscon Fraise, comprimés à croquer: emballages de 8, 16, 24, 32, 48, ou 64 comprimés à croquer.

Titulaire de l'autorisation

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

