

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien (ou de votre droguiste). Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

ialugen® crème, compresse imprégnée

IBSA Institut Biochimique SA

Qu'est-ce que ialugen et quand est-il utilisé?

ialugen contient comme principe actif le hyaluronate de sodium, substance naturelle qui accélère la cicatrisation. ialugen, qui est disponible sous forme de crème et de compresses imprégnées, est une préparation cicatrisante qui accélère la guérison des plaies mineures et des brûlures légères peu étendues (du 1^{er} degré).

ialugen peut être utilisé pour le traitement des ulcères uniquement sur prescription médicale.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les plaies de grande surface, très souillées ou profondes, telles que les plaies dues à une morsure ou à une blessure par instrument tranchant, nécessitent un traitement médical (risque de tétanos). Dans le cas où le périmètre de la blessure ne diminue pas au bout d'un certain temps, ou si la plaie ne se cicatrise pas dans un délai de 10 à 14 jours, veuillez également consulter un médecin. Faites de même si les lèvres de la plaie sont très rouges, si celle-ci enfle subitement, devient très douloureuse, ou encore si la blessure est accompagnée de fièvre (risque d'empoisonnement du sang).

Quand ialugen ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser ialugen crème et compresses si vous êtes allergique à l'une ou plusieurs des substances qu'il contient (voir «Que contient ialugen?»). La même restriction s'applique également dans les cas de plaies graves, profondes et très souillées. De telles blessures doivent impérativement être soignées par le médecin.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de ialugen?

Dans de très rares cas, mais en particulier en cas d'utilisation prolongée, le hyaluronate de sodium ou éventuellement les adjuvants contenus dans les préparations de ialugen peuvent provoquer des phénomènes allergiques, comme par ex. des démangeaisons (voir «Quels effets indésirables ialugen peut-il provoquer?»). Dans ce cas il est conseillé d'interrompre le traitement et de renseigner votre médecin.

ialugen crème contient de l'alcool cetostéarylique et de l'acide sorbique (E200). Ceux-ci peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

ialugen crème contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et parahydroxybenzoate de propyle (E216) qui peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

ialugen crème contient du laurilsulfate de sodium (E487) qui peut provoquer des réactions cutanées locales ou augmenter les réactions cutanées causées par d'autres produits lorsqu'ils sont appliqués sur la même zone.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

ialugen peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?



Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis du médecin.

Comment utiliser ialugen?

Avant l'application de ialugen crème ou compresses, il est nécessaire de procéder au nettoyage et à la désinfection des plaies et de leur contour. Il est notamment recommandé d'enlever les résidus de crème provenant d'une application précédente.

Crème: sauf autre prescription du médecin, il faut appliquer la crème ialugen en fine couche, uniformément sur toute la lésion, 2 à 3 fois par jour, jusqu'à cicatrisation. La crème peut être éliminée par simple lavage à l'eau.

Compresses imprégnées: suivant la surface de la plaie, il faut appliquer une ou plusieurs compresses, 2 ou plusieurs fois par jour. La compresse de ialugen doit être prélevée avec une pincette stérile et appliquée sur la plaie préalablement nettoyée et désinfectée; puis on la recouvre avec une gaze stérile et on protège le tout par de la ouate que l'on fixe avec un bandage approprié.

Les emballages unitaires sont prévus pour un unique emploi.

L'utilisation et la sécurité d'emploi de ialugen n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent. Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires ialugen peut-il provoquer?

L'utilisation de ialugen peut provoquer les effets secondaires suivants:

dans de très rares cas, mais en particulier en cas d'utilisation prolongée, le hyaluronate de sodium ou éventuellement les adjuvants contenus dans les préparations de ialugen peuvent provoquer des phénomènes allergiques (p.ex démangeaisons, eczéma, rougeur, réaction cutanée ou sensation de brûlure). Dans ce cas il est conseillé d'interrompre le traitement et de renseigner votre médecin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant sur l'emballage après la mention «EXP».

Délai d'utilisation après ouverture

Une fois ouvert, le flacon de 500 g doit être utilisé dans les 6 mois.

Remarques concernant le stockage

Crème:

Conserver à température ambiante (15-25°C) et garder hors de portée des enfants.

Compresses imprégnées:

Conserver à température ambiante (15-25°C), à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Si la date de péremption est échuë, il ne faut plus utiliser le médicament, mais le rapporter à la pharmacie qui se chargera de l'éliminer.



Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient ialugen?

Principe actif:

Crème:

1 g de crème contient 2 mg de hyaluronate sodique.

Compresse imprégnée:

1 compresse (100 cm²) est imprégnée avec 4 g de pommade et contient 2 mg de hyaluronate sodique.

Excipients

Crème: alcool cetostéarylique, glucoside cetostéarylique, oléate de décyle, laurilsulfate de sodium (E487), acide sorbique (E200), sulphate de cetostéaryle sodique, glycérol, sorbitol liquide (non cristallisable), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), citrate de sodium dihydraté, eau purifiée.

Compresse imprégnée: macrogol 4000, glycérol, eau purifiée.

Matériau de support: compresse en fil de coton.

Numéro d'autorisation

48118, 48119 (Swissmedic).

Où obtenez-vous ialugen? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Crème: tubes de 25 g et de 60 g (D).

Compresse imprégnée 10 x 10 cm: boîtes de 10 et 30 compresses (en sachets unitaires) (D).

Titulaire de l'autorisation

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

