

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

OMIDA® Cardiospermum peu grasse, crème

Médicament homéopathique

Quand OMIDA Cardiospermum peu grasse est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, OMIDA Cardiospermum peu grasse peut être utilisé en cas de maladies de la peau telles que des inflammations cutanées avec démangeaisons, comme eczéma, névrodermite (eczéma endogène) ainsi que pour les peaux à tendance allergique.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de forte inflammation ou infection de la peau ou de lésions cutanées étendues ainsi que lors de fièvre ou de douleurs persistantes, d'origine indéterminée ou apparaissant soudainement (suspicion d'une maladie systémique) il est recommandé de consulter un médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si OMIDA Cardiospermum peu grasse peut être utilisé simultanément.

Quand OMIDA Cardiospermum peu grasse ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

OMIDA Cardiospermum peu grasse ne doit pas être appliqué si vous réagissez de manière hypersensible (allergique) à la substance active ou à l'un des autres composants, p. ex. l'alcool benzylique, d'OMIDA Cardiospermum peu grasse, ainsi que sur des plaies ouvertes et infectées par des bactéries et en cas de lésions cutanées étendues.

Chez les enfants de moins de 2 ans, OMIDA Cardiospermum peu grasse ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin.

Ce médicament contient 10 mg d'alcool benzylique par 1 g de crème, correspondant à environ 3 cm brin de crème. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques.

Alcool cétylique peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Ce médicament contient 61 mg d'alcool (éthanol) par 1 g de crème. Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez d'autres médicaments (même en automédication)!



OMIDA Cardiospermum peu grasse peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser OMIDA Cardiospermum peu grasse?

Enfants dès 2 ans, adolescents et adultes:

Sauf prescription contraire du médecin, appliquer selon les besoins plusieurs fois par jour en couche mince sur les zones atteintes.

Chez les enfants de moins de 2 ans, OMIDA Cardiospermum peu grasse ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin.

Évitez le contact de la crème avec les yeux, les muqueuses ainsi que les plaies ouvertes et profondes (voir aussi sous «Quand OMIDA Cardiospermum peu grasse ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?»). Nettoyez vos mains après l'application de la crème.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires OMIDA Cardiospermum peu grasse peut-il provoquer?

On observe rarement des réactions d'hypersensibilité sous forme de réactions de la peau (p. ex. allergie envers l'un des composants). Dans ces cas, le traitement doit être interrompu et un médecin doit être consulté.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec OMIDA Cardiospermum peu grasse et informez-en votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

À utiliser dans les 12 mois après ouverture.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient OMIDA Cardiospermum peu grasse?



1 g de crème contient:

Principe actif

Cardiospermum halicacabum (HAB) TM 100 mg

Excipients

Eau purifiée, stéarate de glycol, glycérol 85 %, heptanoate de stéaryle, alcool cétylique 20 mg, paraffine huileuse, myristate d'isopropyle, alcool benzylique 10 mg, hydroxyde de potassium, éthanol 61 mg.

1 g de crème correspond à un brin de crème d'environ 3 cm.

Numéro d'autorisation

51353 (Swissmedic)

Où obtenez-vous OMIDA Cardiospermum peu grasse? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube de 50 g.

Titulaire de l'autorisation

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

