

## **Information destinée aux patients**

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### **Gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen**

#### **Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen sont-elles utilisées?**

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen peuvent être utilisées en cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse.

#### **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?**

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen peuvent être prises simultanément.

#### **Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?**

Lors de troubles tels que le pouls irrégulier, de fortes palpitations, des douleurs lancinantes dans la poitrine, dyspnée (difficulté à respirer) d'apparition soudaine ou se prolongeant, il faut consulter un médecin. Celui-ci saura constater si le cœur ou les vaisseaux sont atteints du point de vue organique ou si les douleurs sont d'origine nerveuse.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

#### **Les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

#### **Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen?**

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas. En cas de troubles aigus, prendre 10 gouttes toutes les 1 à 2 heures au début du traitement, puis réduire la fréquence de la dose selon l'amélioration. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

#### **Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen peuvent-elles provoquer?**

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen et informez votre médecin ou votre pharmacien.

#### **A quoi faut-il encore faire attention?**



Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 35 % vol. d'alcool.

**Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen?**

10 ml contiennent: Lachesis mutus D12 1 ml, Naja naja (Naja tripudians) D12 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 35 % vol. d'alcool.

**Numéro d'autorisation**

45051

**Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R22 Najasthen? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie sans ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

**Titulaire de l'autorisation**

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

**Fabricant**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 09/2005 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

