

## **Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

### **Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen**

#### **Wann werden Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen angewendet?**

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen bei Funktionsstörungen der Leber und Gallenblase, Störungen der Gallensekretion angewendet werden.

#### **Was sollte dazu beachtet werden?**

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen. Bei andauernden oder immer wiederkehrenden Verdauungsstörungen empfiehlt es sich diese ärztlich abzuklären. Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen in diesen Fällen ohne ärztliche Verschreibung nicht angewendet werden.

#### **Wann dürfen Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?**

Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen dürfen bei schweren Erkrankungen der Verdauungsorgane (Verschluss der Gallenwege, Leberschädigung, etc.) nicht ohne ärztlicher Rat angewendet werden. Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen dürfen nicht angewendet werden bei Chininüberempfindlichkeit (Cinchona pubescens).

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

#### **Dürfen Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?**

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

#### **Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen?**

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, 3 mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen. Bei stärker hervortretenden Krankheitserscheinungen kann die Dosis anfangs auf 4-6 mal täglich 10-15 Tropfen bis zur eintretenden Besserung erhöht werden. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

#### **Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen haben?**



Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme oder Anwendung von Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen auftreten: In seltenen Fällen, allergische Reaktionen gegen eine der Komponenten des Präparates. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen ab, und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

#### **Was ist ferner zu beachten?**

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Bei Raumtemperatur (15- 25°C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Die Tropfen enthalten 37 Vol.-% Alkohol.

#### **Was ist in Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen enthalten?**

10 ml enthalten: Chelidonium majus D2 1 ml, Cholesterolum (Cholesterinum) D6 1 ml, Cinchona pubescens (China) D3 1 ml, Colocynthis D6 1 ml, Lycopodium clavatum D4 1 ml, Silybum marianum Carduus marianus) D2 1 ml, Strychnos nux-vomica (Nux-vomica) D4 1 ml und als Hilfsstoffe Wasser und Alkohol. Enthält 37 Vol.-% Alkohol.

#### **Zulassungsnummer**

45039

#### **Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

#### **ZulassungsinhaberIn**

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

#### **HerstellerIn**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32

D-64625 Bensheim

**Diese Packungsbeilage wurde im 11/2004 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.**

