

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

### **Gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen**

#### **Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen e quando si usano?**

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen trovano principalmente impiego in caso di malfunzionament o del fegato e della cistifellea, di disturbi della secrezione biliare.

#### **Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?**

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen. In caso di disturbi digestivi persistenti o recidivanti si consiglia di consultare il medico. In presenza di dispepsia in bambini di età inferiore ai 12 anni consultare il medico per chiarire la natura dei disturbi. Non somministrare in questi casi il prodotto Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen senza prescrizione medica.

#### **Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen e quando la loro somministrazione richiede prudenza?**

In caso di gravi affezioni degli organi dell'apparato digestivo (occlusione delle vie biliari, danni epatici, ecc.) consultare il medico prima dell'impiego di gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen. Le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen è controindicato in caso di ipersensibilità al chinino (*Cinchona pubescens*).

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

#### **Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

#### **Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen?**

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al dì prima dei pasti. Nei casi più gravi: 10-15 gocce 4-6 volte al giorno fino a miglioramento. In caso di aggravamento dei sintomi è possibile aumentare il dosaggio iniziale a 10-15 gocce 4-6 volte al dì fino a miglioramento avvenuto. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

#### **Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen?**

All'assunzione o durante l'uso di gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati: in rari casi reazioni allergiche nei confronti di uno o più componenti del prodotto. Se



osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen e informi il medico o il farmacista.

#### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal vostro medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 37 % Vol.

#### **Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen?**

10 ml contengono: Chelidonium majus D2 1 ml, Cholesterolum (Cholesterinum) D6 1 ml, Cinchona pubescens (China) D3 1 ml, Colocynthis D6 1 ml, Lycopodium clavatum D4 1 ml, Silybum marianum (Carduus marianus) D2 1 ml, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) D4 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 37 % Vol

Numero dell'omologazione

45039

#### **Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R7 Hepagalen? Quali confezioni sono disponibili?**

In vendita in farmacia senza ricetta medica. Flacons di gocce da 50 ml.

#### **Titolare dell'omologazione**

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

#### **Fabbricante**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 11/2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

