

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Pinikehl D4, suppositoires

Médicament homéopathique

Quand Pinikehl D4, suppositoires est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Pinikehl D4, suppositoires peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas d'accès de fièvre accompagné de nausée persistante avec des douleurs épigastriques.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Pinikehl D4, suppositoires peut être pris simultanément.

Quand Pinikehl D4, suppositoires ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescences de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Pinikehl D4, suppositoires peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Pinikehl D4, suppositoires?

Posologie / mode d'emploi chez des adultes: Introduire 1 fois par jour 1 suppositoire dans le rectum avant de se coucher. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Pinikehl D4, suppositoires n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Pinikehl D4, suppositoires peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Pinikehl D4, suppositoires n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en



informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Pinikehl D4, suppositoires et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder le médicament hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Pinikehl D4, suppositoires?

Un suppositoire contient:

200 mg Fomitopsis pinicola e mycelio D4 trituration (HAB, 6)

Cette préparation contient en outre de la graisse solide comme excipient.

Numéro d'autorisation

54972 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Pinikehl D4, suppositoires? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 suppositoires

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2007 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

