

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pinikehl D4, supposte

Medicamento omeopatico

Quando si usa Pinikehl D4, supposte?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Pinikehl D4, supposte può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di febbre alta accompagnata da nausea persistente con dolori epigastrici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Pinikehl D4, supposte.

Quando non si può assumere Pinikehl D4, supposte e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Pinikehl D4, supposte durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Pinikehl D4, supposte?

Posologia / uso negli adulti: Introdurre 1 supposta al giorno nell'ano prima di coricarsi. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell Pinikehl D4, supposte nei bambini e negli adolescenti e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Pinikehl D4, supposte?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Pinikehl D4, supposte. Se osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di



medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Pinikehl D4, supposte e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Pinikehl D4, supposte?

1 supposta contiene:

200 mg Fomitopsis pinicola e mycelio D4 trituration secondo prescrizione 6 HAB.

Questo preparato contiene inoltre grasso solido come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione

54972 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Pinikehl D4, supposte? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 supposte

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2007 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

