

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Emorroidi, crema

Medicamento omeopatico

Quando si usa SIMILASAN Emorroidi ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *SIMILASAN Emorroidi* può essere usato in caso di Emorroidi esterne (noduli) ed interne, Disturbi emorroidali accompagnati da prurito, bruciore, dolori lancinanti e contrazioni convulsive, Leggere emorragie (sangue chiaro), Infiammazione dell'ano.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Rivolgersi al medico in caso di ripetute emorragie.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare *SIMILASAN Emorroidi*.

Quando non si può usare SIMILASAN Emorroidi e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Alla prima manifestazione del disturbo, il trattamento autonomo non può durare per più di 2 settimane. Per eventuali chiarimenti, consultare il medico.

I trattamenti ripetuti devono essere effettuati esclusivamente previa diagnosi esatta da parte di un medico. In caso di perdita di sangue, ripetuti sanguinamenti o sospetta presenza di sangue nelle feci, nonché qualora si manifestino in concomitanza dolori all'ano e febbre, consultare un medico per opportuni accertamenti.

Nei bambini al di sotto dei 12 anni le emorroidi richiedono l'intervento del medico. In questi casi il preparato va quindi somministrato esclusivamente su prescrizione medica.

SIMILASAN Emorroidi contiene olio di arachidi. Non può essere utilizzato se è ipersensibile (allergica/o) all'olio di arachidi o alla soia. Questo medicamento contiene glicole propilenico per 200 mg per 1 g. Localmente, può causare irritazioni della pelle (ad es. dermatite da contatto; alcol cetilico, polisorbato). Il glicole propilenico può causare irritazioni della pelle.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente



Si può usare **SIMILASAN Emorroidi morroidi** durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare **SIMILASAN Emorroidi**?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adolescenti (sopra i 12 anni) e adulti: Spalmare uno strato sottile sulle parti interessate.

- **Disturbi acuti:** Più volte al giorno secondo il bisogno (max 6 volte al giorno).
- **Per la guarigione:** 1 - 2 volte al giorno.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Non adatto ai bambini sotto i 12 anni salvo diversa prescrizione medica.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere **SIMILASAN Emorroidi**?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con **SIMILASAN Emorroidi** e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di **SIMILASAN Emorroidi**. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Dopo l'uso chiudere bene il tubo.

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene **SIMILASAN Emorroidi**?

1 g di *crema* contiene:

Principi attivi



Acidum nitricum (HAB) D10 25 mg / Capsicum annum (HAB) D10 25 mg / Graphites (HAB) D8 25 mg / Hamamelis virginiana (HAB) D8 25 mg

Sostanze ausiliarie

Olio di arachidi idrogenato 200 mg, glicole propilenico (E1520) 200 mg, alcol cetilico 100 mg, polisorbato 60 (E435) (50 mg), acqua per preparazioni iniettabili, complesso sodio-cloruro di argento.

Numero dell'omologazione

51677 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Emorroidi*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: Tubo da 50 g di contenuto

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

