

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg

Salmon Pharma GmbH

Qu'est-ce que Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg et quand doit-il être utilisé?

Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg contient du carbonate de calcium et est destiné au traitement d'une élévation du taux sérique de phosphate en présence d'une atteinte de la fonction rénale.

Selon prescription du médecin.

Quand Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg ne doit-il pas être pris/utilisé?

En cas de taux sérique élevé de calcium (hypercalcémie),

de réduction du taux sérique de phosphate (hypophosphatémie).

En cas de traitement simultané par la vitamine D et ses dérivés.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg?

L'ergocalciférol (vitamine D2), le cholécalciférol (vitamine D3) et en particulier le calcitriol et l'alfacalcidol augmentent l'absorption du calcium et mobilisent le calcium osseux. Des contrôles réguliers de la calcémie sont indispensables en cas d'administration simultanée avec ces agents thérapeutiques. Le carbonate de calcium peut réduire l'absorption du fer, des tétracyclines et du kétoconazole, et peut influencer également l'effet des glucosides cardiotoniques, des bêtabloquants et des anticholinergiques. Un intervalle de trois heures est donc requis entre la prise des médicaments de cette catégorie et celle du Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg.

L'utilisation du Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg est restreinte chez les enfants et les adolescents en raison du peu de données disponibles concernant le dosage.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!)

Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg?

La posologie dépend du taux sérique de phosphate et doit être déterminée individuellement par le médecin traitant. Sauf indication contraire du médecin, la dose initiale est de 6 comprimés pelliculés par jour. Ensuite, la posologie peut être déterminée par le médecin en fonction de la phosphatémie souhaitée.



Avaler les comprimés pelliculés sans les croquer en répartissant la dose journalière sur les repas.

L'utilisation et la sécurité d'emploi du Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg n'ont pas à ce jour été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg peut-il provoquer?

La prise de Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg peut provoquer les effets secondaires suivants:

En cas de prise de doses élevées pendant une période prolongée la calcémie peut augmenter. Des contrôles réguliers permettent au médecin de la contrôler. Suite à la prise de Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg, le gaz carbonique produit peut provoquer des ballonnements et des éructations. Le carbonate de calcium peut également entraîner une constipation.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15 - 25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg?

Principes actifs

1 comprimé pelliculé contient 500 mg de carbonate de calcium, correspondant à 200 mg de calcium.

Excipients

Povidone K 30, crospovidone, silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, talc, dioxyde de titane (E 171), macrogol 6000, lactose monohydraté, hypromellose, stéarate de macrogol 400.

Numéro d'autorisation

50383 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Carbonate de calcium Salmon Pharma 500 mg? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 100 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'autorisation

Salmon Pharma GmbH, Bâle.

Fabricant

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, D-58638 Iserlohn

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).



