

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Regenaplex Nr. 12 Gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Regenaplex Nr. 12?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Regenaplex Nr. 12 può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di spasmi coronarici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Quando compaiono improvvisamente o persistono polso irregolare, forti palpitazioni, dolori trafittivi al torace e affanno, è opportuno rivolgersi al medico, che potrà stabilire se il cuore o i vasi sanguigni sono affetti da una malattia organica o se i disturbi sono di origine nervosa. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Regenaplex Nr. 12.

Quando non si può usare Regenaplex Nr. 12 e quando il suo uso richiede prudenza?

Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente, non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Regenaplex Nr. 12 durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare Regenaplex Nr. 12?

Se il medico non ha prescritto diversamente:

Adulti: 8 - 10 gocce, 1 - 2 volte al giorno.

Istruzioni per l'assunzione: Versare le gocce direttamente sulla lingua o diluire con un po' d'acqua. Trattenere le gocce in bocca almeno per un minuto, prima di deglutirle. Non mangiare né bere nulla 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'assunzione del medicamento. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Regenaplex Nr. 12?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Regenaplex Nr. 12. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Regenaplex Nr. 12 e informi



il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare le gocce a temperatura ambiente (15 - 25 °C).

Le gocce contengono alcool 50% vol.

Cosa contiene Regenaplex Nr. 12?

10,0 ml contiene volta 1,00 ml: Acidum arsenicosum D 60, Aesculus hippocastanum D 20, Aloe D 30, Arnica montana D 20; Cuprum aceticum D 10, Cuprum metallicum D 20, Helleborus niger D 8, Hypericum perforatum D 8, Natrium tetrachloroauratum D 60, Strychnos nux-vomica D 20.

Le gocce contengono alcool 50% vol.

Numero dell'omologazione

36846 01 011

Dove è ottenibile Regenaplex Nr. 12? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni: 15 ml

Titolare dell'omologazione

REGENA AG, Tägerwilen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2011 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

