

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non può essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Posiformin 2%

Ursapharm Schweiz GmbH

Che cos'è Posiformin 2% e quando si usa?

Posiformin 2% è una pomata oftalmica ad azione disinfettante, astringente ed inibitrice delle secrezioni che viene utilizzata su prescrizione medica in presenza di stati di irritazione dell'occhio esterno non causati da agenti patogeni e in caso di blefariti croniche (di lunga durata) non causate da agenti patogeni. In caso di disturbi persistenti o in mancanza di un miglioramento consultare immediatamente un medico.

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere/usare Posiformin 2%?

L'utilizzo di Posiformin 2% è sconsigliato:

- in caso di ipersensibilità (allergia) accertata al bibrocatolo o a uno degli altri componenti di Posiformin 2%
- quando si stanno portando lenti a contatto

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Posiformin 2%?

Se si nota un peggioramento dei sintomi e se nell'arco di alcuni giorni non si verifica alcun miglioramento, consultare immediatamente un medico.

Si prega di notare che ciò vale anche in caso di medicinali assunti di recente. Se si utilizzano altri colliri o pomate oftalmiche lasciare trascorrere 15 minuti tra un'applicazione e l'altra dei singoli preparati. Le pomate oftalmiche si devono utilizzare sempre per ultime.

Questo medicamento può ridurre la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine. Siccome l'assunzione di Posiformin 2% può provocare disturbi visivi, si consiglia di aspettare che la vista ritorni chiara prima di riprendere la guida di un veicolo o l'uso di macchine.

Posiformin 2% contiene lanolina, che può causare irritazioni cutanee localmente limitate (ad es. dermatite da contatto).

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere/usare Posiformin 2% durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora non sono noti rischi per il bambino purché il medicinale venga utilizzato correttamente. Tuttavia, non sono state ancora condotte indagini scientifiche sistematiche al riguardo.

La somministrazione del medicamento durante la gravidanza e l'allattamento deve essere evitata, a meno che il medico non la ritenga inequivocalmente necessaria.

Come usare Posiformin 2%?

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Adulti

Assumere Posiformin 2% seguendo sempre esattamente le indicazioni del medico. In caso di dubbi rivolgersi al proprio medico o farmacista.

Salvo indicazione contraria da parte del medico, il dosaggio usuale è il seguente:

applicare da 3 a 5 volte al dì una striscia di pomata lunga 0,5 cm circa nel sacco congiuntivale dell'occhio malato.

L'efficacia e la sicurezza di Posiformin 2% nei bambini e nei minori di 18 anni non è stata verificata.

Fondamentalmente le pomate oftalmiche devono essere utilizzate in modo da evitare ogni contatto tra l'estremità del tubetto e l'occhio o la pelle del viso. Svitare il tappo del tubetto, reclinare la testa leggermente all'indietro, allontanare un poco la palpebra dall'occhio ed applicare una striscia di pomata nel sacco congiuntivale esercitando una leggera pressione sul tubetto. Chiudere lentamente le palpebre. Richiudere bene il tubetto dopo l'uso.

Distribuire regolarmente le applicazioni nell'arco della giornata.

Posiformin 2% si può utilizzare fino alla scomparsa dei sintomi.

In caso di disturbi persistenti o in mancanza di un miglioramento consultare immediatamente un medico.

In caso di stati di irritazione cronici dell'occhio consultare sempre un medico oculista. Evitare l'utilizzo prolungato non controllato.

Non modificare il dosaggio prescritto di propria iniziativa. Se si ritiene che l'effetto del medicinale sia troppo blando o troppo forte, consultare il proprio medico o farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Posiformin 2%?

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000)

Ipersensibilità (allergia) al bibrocato (il principio attivo di Posiformin 2%) o a uno dei componenti della pomata.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Arrossamento, bruciore, gonfiore ed eczema delle palpebre, offuscamento della vista, altri disturbi della vista e gonfiore del viso

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Per salvaguardare la sterilità della pomata oftalmica non toccare l'estremità del tubetto con le mani o con gli occhi. Richiudere bene il tubetto subito dopo l'uso.

Termine di consumo dopo l'apertura

Una volta aperto il tubetto consumare la pomata oftalmica entro 30 giorni.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare nella confezione originale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Se il tubetto alla fine del trattamento non è vuoto, riconsegnarlo alla fonte (medico o farmacista) affinché provveda al suo corretto smaltimento.



Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono fornire ulteriori informazioni.

Cosa contiene Posiformin 2%?

1 g di pomata oftalmica contiene

Principi attivi

Bibrocatolo 20 g

Sostanze ausiliarie

vaselina bianca, paraffina densa e lanolina.

Numero dell'omologazione

62179 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Posiformin 2%? Quali confezioni sono disponibili?

Nelle farmacie esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica.

1 tubetto con 5 g di pomata oftalmica

Titolare dell'omologazione

Ursapharm Schweiz GmbH, 6331 Hünenberg

Fabbricante

Ursapharm Arzneimittel GmbH, 66129 Saarbrücken - Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

