

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Fluidose

### Qu'est-ce que le Fluidose et quand doit-il être utilisé?

Fluidose est une solution de larmes artificielles.

Fluidose est utilisé sur recommandation du pharmacien ou prescription du médecin pour l'humidification des yeux dans le syndrome de l'œil sec d'origines diverses.

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis par votre pharmacien ou droguiste afin de traiter vos troubles oculaires actuels. Ne l'utilisez pas pour le traitement d'autres maladies ou d'autres personnes.

*Avis aux porteurs de lentilles de contact:* Si vous portez des lentilles de contact, ôtez-les avant d'instiller Fluidose, puis attendez au moins 20 minutes avant de les remettre.

### Quand Fluidose ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'hypersensibilité connue ou suspectée (allergie) à l'un des composants de Fluidose.

### Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fluidose?

Si aucune amélioration ne survient au cours des 2 ou 3 premiers jours de traitement, veuillez consulter votre médecin. Un traitement de longue durée doit être effectué sous surveillance médicale. En cas d'aggravation ou d'apparition de nouveaux symptômes, par exemple une baisse de l'acuité visuelle, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.

On note parfois des troubles visuels (vision brouillée) immédiatement après l'instillation de Fluidose. Dans ces cas, il est recommandé de ne pas conduire de véhicule ou d'utiliser des machines jusqu'à la normalisation de la vision.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'autres maladies, si vous êtes allergique, si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou en application dans l'œil (même en automédication).

### Fluidose peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, n'utilisez Fluidose qu'après autorisation de votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### Comment utiliser Fluidose ?



**Adultes:** Instiller 3 fois par jour une goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil atteint. Si besoin, vous pouvez augmenter le nombre d'instillations quotidiennes.

### *Utilisation*

Veuillez vous laver soigneusement les mains avant d'utiliser Fluidose. Détachez une dose unitaire de la bandelette, ouvrez la dose en tournant l'embout sur lui-même et instillez la solution dans l'œil.

Si vous devez utiliser d'autres médicaments pour les yeux, veuillez respecter un intervalle d'au moins 15 minutes entre les différentes instillations, Fluidose étant toujours instillé en dernier. Utilisez pour chaque instillation une nouvelle monodose et éliminez-la immédiatement après utilisation.

Il n'est pas recommandé d'utiliser Fluidose chez les adolescents et les enfants du fait qu'aucune étude systématique n'a été effectuée dans ces classes d'âge.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### **Quels effets secondaires Fluidose peut-il provoquer?**

L'utilisation de Fluidose peut entraîner les effets secondaires suivants :

*Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).*

#### *Affections du système immunitaire*

Des réactions d'hypersensibilité à l'un des composants sont possibles.

#### *Affections oculaires*

Troubles de la vision passagers et sensation de brûlure ou piquûre légère immédiatement suite à l'instillation de Fluidose, résultant en une vision brouillée passagère.

Sensation des paupières collées et irritations suite à l'application.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

### **A quoi faut-il encore faire attention?**

#### *Stabilité*

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Utilisez pour chaque application une nouvelle monodose et jetez-la immédiatement après utilisation. Après ouverture des sachets, utilisez le contenu au cours de 4 semaines.

#### *Remarques concernant le stockage*

Conserver le médicament dans son emballage d'origine fermé pour le protéger de la lumière.

Conserver à température ambiante (15-25°C).



Tenir hors de portée des enfants.

Une fois le traitement terminé, rapportez le médicament restant sur le lieu de distribution (cabinet médical, pharmacie ou droguerie) qui se chargera de l'éliminer correctement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### **Que contient Fluidose ?**

*Fluidose collyre, solution en récipient monodose*

*Chaque monodose prête à l'emploi de 0,4 ml contient:*

*Principes actifs*

0,52 mg de Carbomerum 980

*Excipients.*

Sorbitol, édétate de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour solution injectable

### **Numéro d'autorisation**

57779 (Swissmedic)

### **Où obtenez-vous Fluidose ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Fluidose collyre, solution 10 monodoses de 0,4 ml (D)

Fluidose collyre solution 30 monodoses de 0,4 ml (D)

### **Titulaire de l'autorisation**

CHEPLAPHARM Schweiz GmbH, Huebweg 18-20, 4102 Binningen

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

