

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fluidose

Che cos'è Fluidose e quando si usa?

Fluidose è un sostituto lacrimale (lacrime artificiali).

Fluidose viene utilizzato su consiglio del farmacista o su prescrizione medica per umettare gli occhi in caso di secchezza oculare dovuta a diverse cause.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico, o le è stato consegnato dal suo farmacista o droghiere per il trattamento degli attuali disturbi agli occhi. Non lo utilizzi per trattare altre malattie o altre persone.

Avvertenza per portatori di lenti a contatto: tolga le lenti a contatto prima dell'instillazione di Fluidose e le rimetta non prima di 20 minuti.

Quando non si può usare Fluidose?

Nel caso di ipersensibilità (allergia) accertata o presunta a uno dei componenti di Fluidose.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Fluidose?

Se dopo 2-3 giorni non si verifica un miglioramento, consulti un medico. Una terapia a lungo termine deve essere effettuata sotto controllo medico. Se avverte un peggioramento o compaiono nuovi sintomi, come p. es. una diminuzione dell'acutezza visiva, consulti immediatamente un medico.

Per un breve periodo dopo l'applicazione è possibile che la vista risulti offuscata. In questo caso deve rinunciare a condurre un veicolo o a utilizzare macchine fino alla normalizzazione della vista.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applichi agli occhi altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Fluidose durante la gravidanza o l'allattamento?

L'uso durante la gravidanza e l'allattamento deve avvenire solo previo consenso del suo medico, farmacista o droghiere.

Come usare Fluidose?

Adulti: instillare 3 volte al giorno 1 goccia nel sacco congiuntivale dell'occhio sofferente. La frequenza delle applicazioni può, all'occorrenza, essere aumentata.

Uso



Lavarsi le mani prima di usare il medicamento. Ruotare il tappo per aprire il contenitore e instillare la soluzione nell'occhio.

Se usa altri preparati oculari, deve attendere 15 minuti tra un'applicazione e l'altra dei preparati nell'occhio. Fluidose va sempre instillato come ultimo preparato. Utilizzi per ogni applicazione una nuova monodose e la getti subito dopo l'uso.

L'uso nei bambini e negli adolescenti non è consigliato, dato che non sono stati eseguiti studi pertinenti per queste classi d'età.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Fluidose?

Utilizzando Fluidose possono comparire i seguenti effetti collaterali:

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Disturbi del sistema immunitario

Sono possibili reazioni di ipersensibilità a un componente.

Patologie dell'occhio

Disturbi passeggeri della vista, leggero bruciore e punture immediatamente dopo l'instillazione, che causano un temporaneo offuscamento della vista. Sensazione di palpebre appiccicose e irritazione dopo l'applicazione.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Per ogni applicazione dev'essere usata una nuova monodose, che deve poi essere subito gettata. Dopo l'apertura della bustina, le monodosi non possono essere utilizzate oltre quattro settimane.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale chiusa al riparo dalla luce e a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conclusa la terapia, consegnare la confezione aperta al punto di fornitura (studio medico, farmacia o drogheria) per un corretto smaltimento.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fluidose?

Fluidose gocce oculari, soluzione in contenitore monodose.

Una monodose pronta all'uso da 0,4 ml contiene:



Principi attivi

0,52 mg di carbomer 980

Sostanze ausiliarie

Sorbitolo, sodio edetato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili

Numero dell'omologazione

57779 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Fluidose? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Fluidose gocce oculari, soluzione: 10 monodosi da 0,4 ml (D)

Fluidose gocce oculari, soluzione: 30 monodosi da 0,4 ml (D)

Titolare dell'omologazione

CHEPLAPHARM Schweiz GmbH, Huebweg 18-20, 4102 Binningen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

