

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Freka-Clyss®

Fresenius Kabi (Schweiz) AG

Che cos'è Freka-Clyss e quando si usa?

Freka-Clyss è un liquido per clistere per lo svuotamento intestinale.

Freka-Clyss non agisce sui tratti superiori dell'intestino ed è quindi indicato in particolare nei casi in cui i lassativi per via orale sono sconsigliati o possono dare luogo ad irritazioni, come ad esempio per la preparazione di esami intestinali.

Freka-Clyss può essere usato anche nei pazienti che dovrebbero evitare sforzi per lo svuotamento intestinale.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Come per tutti i lassativi, un abuso di Freka-Clyss può causare dipendenza.

Quando non si può assumere/usare Freka-Clyss?

Freka-Clyss deve essere usato solo in caso di necessità. Freka-Clyss non può essere somministrato in caso di nausea, vomito, ulcera gastrica, anomalie dell'intestino crasso e di insufficienza renale acuta.

Freka-Clyss non può essere somministrato in caso di lacerazione della mucosa rettale (fissurazione nel retto o nel canale anale) a causa del rischio di perforazione.

Freka-Clyss non deve essere somministrato nei neonati, nei bambini piccoli e nei bambini di età inferiore ai 12 anni a causa del rischio di gravi effetti indesiderati con esito potenzialmente fatale (vedere anche indicazione alla voce «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Freka-Clyss?, Bambini»).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Freka-Clyss?

In caso di uso ripetuto di Freka-Clyss, la mucosa intestinale assorbe una parte del sodio contenuto nella soluzione. Di ciò occorre tener conto nei pazienti con patologie cardiache, patologie renali e con alta pressione.

L'uso scorretto può portare a lesioni della mucosa intestinale. La soluzione contenente fosfati può quindi causare infiammazioni e distruzione dei tessuti. Può anche verificarsi perforazione intestinale. Contattare immediatamente un medico se dopo la somministrazione di Freka-Clyss si notano cambiamenti dello stato di salute o se compaiono dolore o sanguinamenti dall'ano.

Bambini

Freka-Clyss non deve essere utilizzato in neonati, bambini piccoli e bambini di età inferiore ai 12 anni. Il suo utilizzo nei bambini può causare gravi complicanze, anche mortali; in particolare, disturbi elettrolitici, soprattutto aumento del fosfato nel siero (iperfosfatemia) e riduzione del calcio nel siero (ipocalcemia), con le relative conseguenze cliniche come tetania e disturbi del ritmo cardiaco.

Pertanto, il trattamento di bambini più grandi e adolescenti con Freka-Clyss richiede la dovuta cautela.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui: soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Freka-Clyss contiene metil-paraidrossibenzoato (E 218) che può causare reazioni allergiche, anche ritardate. Nei pazienti allergici al metilparabene non è ammesso l'uso di Freka-Clyss.



Freka-Clyss contiene 133 mg di benzoato di sodio (E 211) per flacone.

Si può assumere/usare Freka-Clyss durante la gravidanza o l'allattamento?

All'inizio della gravidanza occorre evitare l'uso di Freka-Clyss, lo stesso vale in caso di minaccia d'aborto o di parto prematuro. Non sono ancora state compiute indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere. Durante l'allattamento Freka-Clyss deve essere usato solo in casi urgenti.

Come usare Freka-Clyss?

Per gli adulti e gli adolescenti dall'età di 12 anni serve 1 flacone. In casi particolarmente ostinati e per particolari usi clinici: 2-3 flaconi consecutivi. Per la preparazione di esami, generalmente è sufficiente somministrare Freka-Clyss una mezz'ora prima.

Freka-Clyss deve essere usato a temperatura ambiente (15-25°C)!

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere. Freka-Clyss dovrebbe essere usato come segue: vedi istruzioni per l'uso.

Quali effetti collaterali può avere Freka-Clyss?

Possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Con l'uso corretto di Freka-Clyss non sono stati osservati finora effetti collaterali. Ciò nonostante può provocare malesseri (irritazioni, crampi). Con Freka-Clyss si può osservare un aumento dei livelli di fosfato (iperfosfatemia) o una riduzione dei livelli di calcio (ipocalcemia) nel sangue, soprattutto in caso di errori nell'uso e mancata considerazione delle controindicazioni. Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Freka-Clyss non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione. Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Conservazione a temperatura ambiente (15–25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Cosa contiene Freka-Clyss?

Freka-Clyss contiene:

Principi attivi

Diidrogenofosfato di sodio anidro 139,1 mg/ml, monoidrogenofosfato di sodio 31,8 mg/ml

Sostanze ausiliarie

Benzoato di sodio (E211), metile-4-idrossibenzoato (E218), idrossido di sodio (per la regolazione del pH), acqua purificata

Numero dell'omologazione

36308 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Freka-Clyss? Quali confezioni sono disponibili?

Può trovare Freka-Clyss nelle farmacie e drogherie senza prescrizione medica.

Sono disponibili confezioni con 1 × 133 ml e confezioni multiple con 20 x 133 ml.

Titolare dell'omologazione

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, 6010 Kriens.



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

