

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Demogripal® C, granulato per soluzione orale

VERFORA SA

Che cos'è Demogripal C e quando si usa?

Demogripal C si prende come soluzione orale calda per attenuare la febbre e i dolori nelle malattie da raffreddamento. Demogripal C contiene come principi attivi paracetamolo e vitamina C.

Grazie alle proprietà prevalentemente antipiretiche e analgesiche, Demogripal C allevia i disturbi come i brividi, la febbre, il mal di testa e i dolori agli arti. La vitamina C rafforza la resistenza dell'organismo e facilita la guarigione nei casi di influenza e di malattie da raffreddamento. Se preso già quando si manifestano i primi sintomi, Demogripal C combatte i forti accessi di febbre. L'effetto analgesico si mantiene fino a 6 ore.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Non si dovrebbe prendere medicinali che contengono paracetamolo (tali Demogripal C) regolarmente per lungo tempo senza un controllo medico.

Negli alti stati febbrili (oltre 39,5 °C) o quando la febbre dura più di 3 giorni, si deve consultare un medico; lo stesso se gli altri sintomi non migliorano entro 5 giorni. Il medico deciderà se sarà necessario prendere altre misure.

Non superare il dosaggio indicato o prescritto dal medico. Per evitare il rischio di sovradosaggio occorre accertarsi che altri medicinali assunti contemporaneamente non contengano paracetamolo. Va pure tenuto presente che l'assunzione continua di analgesici può causare l'apparizione di nuove cefalee che può portare, a sua volta, a una nuova assunzione, e contribuire alla persistenza del mal di testa. In questi casi, contattare il proprio medico.

Quando non si può usare Demogripal C?

Nei casi seguenti non si deve far uso di Demogripal C:

- ipersensibilità (allergia) alla sostanza attiva paracetamolo o a uno degli eccipienti, che può manifestarsi p. es. con asma, respiro affannoso, disturbi circolatori, tumefazioni cutanee e delle mucose o eruzioni cutanee (orticaria);
- se soffre di itterizia (epatite);
- se soffre di una grave malattia epatica;
- nei casi di alcolismo cronico o dopo un consumo eccessivo di bevande alcoliche;
- per i bambini al di sotto dei 12 anni;
- in caso di malattia epatica genetica (cosiddetto morbo di Gilbert-Meulengracht);
- nei casi di calcoli renali o urinari.

Se soffre di un disturbo genetico della formazione del sangue, chiedi dapprima al suo medico se può far uso di Demogripal C.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Demogripal C?

Se soffre di una malattia del fegato o dei reni, oppure di calcoli renali o se ha una grave infezione (per es. sepsi) o se soffre di «carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi» (rara malattia ereditaria dei globuli rossi), consulti il suo medico prima di prendere Demogripal C.



In casi molto rari, il paracetamolo può causare reazioni cutanee gravi (ad es. pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e necrosi epidermica tossica (NET)).

Se si manifestano i primi segni di una reazione cutanea, interrompere l'assunzione di Demogripal C e contattare immediatamente il medico (vedere «Quali effetti collaterali può avere Demogripal C?»).

I medicinali contro la febbre e l'influenza come Demogripal C non devono essere presi per lungo tempo o a forti dosi senza sottoporsi a un controllo medico. Se deve far uso di un simile medicamento per lungo tempo, consulti il suo medico. Alla somministrazione prolungata di grandi quantità di preparati a base di paracetamolo sono già stati attribuiti lesioni renali o insufficienza renale. In caso di sovradosaggio, cure mediche immediate sono necessarie anche in assenza di sintomi, perché una dose eccessiva può causare gravi danni al fegato.

In caso di assunzione simultanea di medicinali che influiscono sul fegato, specialmente alcuni medicinali contro la tubercolosi (rifampicina, isoniazide) e le crisi convulsive (epilessia) (fenitoina, carbamazepina), taluni sonniferi (barbiturati), oppure preparati che modificano la velocità di svuotamento gastrico (ad es. metoclopramide), oppure medicinali a base di zidovudina, usati in caso di immunodeficienza (AIDS), oppure medicinali contro la gotta con i principi attivi probenecid, oppure medicinali contro il colesterolo con la sostanza colestiramina, oppure alcuni anticoagulanti, l'uso deve avvenire solo dietro prescrizione e sotto rigoroso controllo del medico.

Durante il trattamento con Demogripal C, informi immediatamente il suo medico se soffre di malattie gravi, quali insufficienza renale grave o sepsi (quando i batteri e le loro tossine circolano nel sangue, causando danni agli organi), o se soffre di malnutrizione, alcolismo cronico o se sta assumendo anche flucloxacillina (un antibiotico). È stata segnalata una grave condizione chiamata acidosi metabolica (un'anomalia del sangue e dei liquidi) in pazienti che assumono regolarmente paracetamolo per un periodo prolungato o che assumono paracetamolo in associazione con flucloxacillina. I sintomi dell'acidosi metabolica possono includere: gravi difficoltà respiratorie con respiro rapido e profondo, sonnolenza, sensazione di vomito (nausea) e vomito.

Il consumo di alcol durante il trattamento con Demogripal C è sconsigliato. Il rischio di danno epatico è particolarmente elevato in caso di concomitante carenza alimentare. Non somministrare medicinali contenenti il principio attivo paracetamolo a bambini che abbiano consumato alcol accidentalmente.

In caso di disturbi alimentari, quali anoressia, bulimia e perdita di peso eccessiva, e in caso di malnutrizione cronica, è richiesta prudenza con la somministrazione di Demogripal C. Anche in caso di disidratazione e riduzione del volume del sangue, è richiesta prudenza con la somministrazione di Demogripal C.

Alcune persone ipersensibili agli analgesici e agli antireumatici possono sviluppare anche un'ipersensibilità al paracetamolo (vedere «Quali effetti collaterali può avere Demogripal C?»).

Demogripal C contiene 30 mg di aspartame (E 951) per bustina. Aspartame è una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.

Questo medicamento contiene mannitolo (E 421), che può avere un lieve effetto lassativo.

Demogripal C contiene saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per bustina, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare Demogripal C durante la gravidanza o l'allattamento?



Per prudenza si raccomanda di rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, farmacista o droghiere.

Se necessario, Demogripal C può essere utilizzato durante la gravidanza. I dati finora disponibili indicano un basso rischio per il bambino se il principio attivo paracetamolo viene utilizzato per un trattamento di breve durata e al dosaggio indicato. Si deve usare la dose più bassa sufficiente ad alleviare il dolore e/o la febbre e utilizzare il medicamento per il minor tempo possibile. Consulti il suo medico, il suo farmacista o il droghiere se il dolore e/o la febbre non si sono attenuati o se deve assumere il medicamento con maggiore frequenza.

Sebbene l'uso del paracetamolo sia considerato compatibile con l'allattamento, occorre essere prudenti quando si usa Demogripal C durante il periodo di allattamento, poiché il paracetamolo passa nel latte materno.

Come usare Demogripal C?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Adulti: 3-4 volte al giorno 1 bustina sciolta in una tazza d'acqua calda (ca. 1,5-2 dl) e bere ben calda. Intervallo tra le dosi: da 4 a 8 ore. Una dose giornaliera di 8 bustine (= 4 g di paracetamolo) non dev'essere superata.

Bambini al di sopra dei 12 anni (peso corporeo superiore a 40 kg): 2 volte al giorno una bustina. Intervallo tra le dosi: da 4 a 8 ore.

Bambini al di sotto dei 12 anni: questo preparato non è adatto.

La durata del trattamento è limitata a 3 giorni in caso di febbre, a 5 giorni in tutti gli altri casi.

La febbre alta e un peggioramento dello stato di salute nei bambini richiede un consulto medico immediato.

In caso di posologia eccessiva, cure mediche immediate sono necessarie anche in assenza di sintomi, perché una dose eccessiva può causare gravi danni al fegato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Demogripal C?

Con l'assunzione di Demogripal C possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: in rari casi certe persone presentano reazioni d'ipersensibilità (allergia) al paracetamolo, il principio attivo di Demogripal C. Se queste persone prendono Demogripal C, l'allergia può manifestarsi con rossore o eruzioni cutanee, fino a gravi reazioni cutanee con formazione di vesciche, desquamazione della pelle e/o sintomi influenzali (molto rare), reazioni circolatorie, nausea, eccesso di sudorazione, oppure respiro affannoso (asma). In tali casi, si deve sospendere subito la somministrazione del medicamento e consultare il medico.

Sono state inoltre osservate alterazioni dell'emogramma, quali la diminuzione del numero di piastrine (trombocitopenia) o un forte calo di determinati globuli bianchi (agranulocitosi).

Frequenza non nota (non può essere stimata sulla base dei dati disponibili): una condizione grave che può rendere il sangue più acido (la cosiddetta acidosi metabolica), nei pazienti affetti da una malattia grave che utilizzano paracetamolo (vedere «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Demogripal C?»).

Poche persone ipersensibili all'acido acetilsalicilico (aspirina) o a medicinali simili (analgesici, antireumatici), sono allergiche anche al paracetamolo contenuto in Demogripal C.

In caso di assunzione incontrollata (sovradosaggio), consultare immediatamente un medico. Nausea, vomito, dolori addominali, mancanza d'appetito e/o malessere generalizzato possono essere segni di sovradosaggio ma non si manifestano che diverse ore, o persino un giorno dopo l'assunzione del medicamento.

Gli eventi seguenti sono stati osservati dopo una posologia eccessiva di paracetamolo:

- grave danno al fegato,
- insufficienza renale acuta,



- una malattia caratterizzata dallo sviluppo in tutto il sistema circolatorio di piccoli coaguli di sangue che ostruiscono i piccoli vasi sanguigni,
- rari casi di infiammazione del pancreas.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Demogripal C?

1 bustina contiene:

Principi attivi

500 mg di paracetamolo e 300 mg di acido ascorbico (vitamina C).

Sostanze ausiliarie

Mannitolo (E 421), acido citrico anidro, aroma di limone (contiene saccarosio), glicina, povidone K25, acesulfame potassico, aspartame (E 951), macrogol 6000, sodio cloruro.

Numero dell'omologazione

51518 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Demogripal C? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

In confezioni di 10 o 20 bustine.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

