

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser le médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Nortriptyline Rivopharm

Qu'est-ce que Nortriptyline Rivopharm et quand doit-il être utilisé ?

La Nortriptyline, principe actif de la Nortriptyline Rivopharm, est destinée au traitement de la dépression. Les patients dépressifs présentent souvent un déficit de certaines substances chimiques du cerveau, telles que la sérotonine et la noradrénaline. Ces substances sont appelées neurotransmetteurs. Elles assurent la transmission des impulsions entre les cellules nerveuses du cerveau, permettant à ces dernières de communiquer entre elles. Les antidépresseurs peuvent éliminer cette carence, améliorant ainsi l'état dépressif du patient.

Nortriptyline Rivopharm est un antidépresseur. Autrement dit, Nortriptyline Rivopharm s'oppose aux symptômes associés à la dépression, tels que l'abattement, la perte d'intérêt, les fluctuations diurnes (meilleure humeur le soir que le matin), les troubles du sommeil (se réveiller tôt et ne pas pouvoir se rendormir) et l'amaigrissement.

Selon prescription du Médecin.

Quand Nortriptyline Rivopharm ne doit-il pas être pris/utilisé ?

Si vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans ce médicament. Vous pouvez trouver ces substances dans la section 6.

- Si vous avez récemment subi une crise cardiaque (infarctus du myocarde).

Si vous présentez des arythmies visibles sur un électrocardiogramme (moniteur cardiaque), ou si vous souffrez d'une forme quelconque d'obstruction cardiaque ou de maladie coronarienne.

Si vous êtes traité par un inhibiteur de la MAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase, un autre type de médicament antidépresseur).



Les MAOI comprennent la phénelzine, l'iproniazide, l'isocarboxazide, le nialamide ou la tranylcypromine pour le traitement de la dépression et la sélégiline pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Si vous avez utilisé l'un de ces produits, vous devez attendre 14 jours avant de commencer à prendre Nortriptyline Rivopharm.

Si vous avez pris un inhibiteur de la MAO, le moclobémide (pour le traitement de la dépression), vous devez attendre un jour avant de commencer à prendre Nortriptyline Rivopharm.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Nortriptyline Rivopharm ?

Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Pensées suicidaires et aggravation de la dépression ou du trouble anxieux

Si vous êtes déprimé et/ou souffrez de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des pensées d'automutilation ou de suicide. Ces pensées peuvent être plus fréquentes lorsque vous commencez à prendre des médicaments antidépresseurs, car ces médicaments ont tous besoin d'un certain temps, généralement environ deux semaines ou parfois plus, pour commencer à agir.

Vous êtes plus susceptible de manifester ce genre de pensées :

- Si vous avez déjà eu des pensées suicidaires ou d'automutilation

Si vous êtes un jeune adulte. Des informations issues d'essais cliniques ont montré un risque accru de comportement suicidaire chez les adultes de moins de 25 ans souffrant de troubles psychiatriques et traités par un antidépresseur.

Si vous avez des idées d'automutilation ou de suicide, contactez **votre médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital.**

Il peut être utile de dire à un ami ou à un membre de votre famille que vous vous sentez déprimé ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et de lui demander de lire cette notice. Vous pouvez leur demander de vous dire s'ils pensent que votre dépression ou votre trouble anxieux s'aggrave ou s'ils s'inquiètent de changements dans votre comportement.

Informez votre médecin si vous souffrez d'une autre affection ou maladie. Il se peut que votre médecin doive en tenir compte. En particulier, informez votre médecin :

- si vous êtes épileptique ou si vous avez déjà eu des crises/convulsions.
- Si vous avez des problèmes pour uriner.
- Si vous avez une hypertrophie de la prostate.
- Si vous avez des problèmes de foie.
- Si vous avez des problèmes cardiaques.
- Si vous avez des problèmes thyroïdiens.
- Si vous souffrez de glaucome (augmentation de la pression dans l'œil).
-



Si vous êtes traité pour le diabète. Il peut être nécessaire d'adapter votre traitement antidiabétique au début de votre traitement par Nortriptyline Rivopharm.

- Si vous souffrez d'une maladie mentale (trouble mental) autre que la dépression.
- Si vous avez besoin d'une intervention chirurgicale. Informez votre médecin que vous prenez ce médicament.
- Si vous avez une pression artérielle basse.
- Si vous avez un mal de gorge, de la fièvre et des symptômes de grippe au cours des 10 premières semaines de traitement.
- Si vous avez une fièvre excessive (hyperpyrexie).
- si vous souffrez d'une maladie cardiaque appelée syndrome de Brugada.

Remarque :

Certains patients atteints de troubles maniaco-dépressifs peuvent connaître une phase maniaque. Elle se caractérise par des pensées inhabituelles et changeant rapidement, une gaieté excessive et une activité physique excessive. Dans ce cas, il est important de consulter votre médecin.

Enfants et jeunes jusqu'à 18 ans

Nortriptyline Rivopharm n'est pas approuvé pour une utilisation chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Aucune recommandation posologique ne peut être donnée. Les patients âgés de moins de 18 ans présentent un risque accru de tentatives de suicide, de pensées suicidaires et d'hostilité (principalement agressivité, comportement oppositionnel et colère) lorsqu'ils sont traités avec des médicaments de cette classe thérapeutique.

Personnes âgées

Les patients âgés doivent faire attention aux chutes de tension dues, par exemple, au fait de se lever rapidement d'une position assise ou couchée, parfois accompagnées de vertiges.

Prenez-vous d'autres médicaments ?

En dehors de Nortriptyline Rivopharm, prenez-vous, avez-vous pris récemment ou allez-vous prendre prochainement d'autres médicaments ? Si c'est le cas, prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Une attention particulière est nécessaire si vous prenez l'un des médicaments suivants :

Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), par exemple le moclobémide (pour traiter la dépression) ou la sélégiline (pour traiter la maladie de Parkinson).

Les médicaments qui font travailler plus fort une certaine partie du système nerveux (sympathomimétiques), tels que l'adrénaline, l'éphédrine, l'isoprénaline, la noradrénaline, la phényléphrine et la phénylpropanolamine (présents dans certains anesthésiques, anesthésiques et remèdes contre le rhume).

Certains médicaments hypotenseurs, tels que la guanéthidine, la bétadine, la réserpine, la clonidine et la méthildopa. Les médicaments tels que la Nortriptyline Rivopharm peuvent contrecarrer les effets antihypertenseurs.



Médicaments ayant un effet inhibiteur sur une certaine partie du système nerveux (anticholinergiques). Les médicaments tels que Nortriptyline Rivopharm peuvent potentialiser les effets de ces médicaments sur les yeux, le système nerveux central, les intestins et la vessie, ce qui peut entraîner une constipation (constipation/obstipation) ou de la fièvre, entre autres.

Les médicaments qui suppriment le système nerveux central, tels que l'alcool ou les barbituriques (sommifères). Nortriptyline Rivopharm peut potentialiser les effets de ces médicaments.

Antipsychotiques (médicaments contre la psychose), sédatifs, anxiolytiques (médicaments qui vous rendent moins anxieux et moins agité), antihistaminiques (pour le traitement des allergies et du rhume des foins), car l'effet narcotique de ces médicaments pourrait être renforcé.

- Médicaments pour une glande thyroïde sous-active (thyroïdostatiques).

Levodopa (médicament contre la maladie de Parkinson). La dégradation de la lévodopa dans l'intestin est favorisée par Nortriptyline Rivopharm.

Disulfiram (médicament pour le traitement de l'alcoolisme) ou tramadol (pour le traitement de la douleur aiguë et chronique modérée à sévère).

- Traitement par ECT (électrochocs).

Médicaments ayant un effet potentialisateur sur le système sérotoninergique, tels que d'autres médicaments antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)). Une maladie rare connue sous le nom de syndrome sérotoninergique peut se développer. Les symptômes peuvent inclure une forte fièvre, de l'agitation, de la confusion, des tremblements et de brusques contractions musculaires.

Antipsychotiques (médicaments destinés à traiter une maladie mentale grave, caractérisée par des symptômes tels que le délire, la perception de choses qui n'existent pas (hallucinations) et des changements progressifs de la personnalité (schizophrénie) et une maladie mentale dans laquelle le contrôle de son propre comportement et de ses propres actions est perturbé (psychoses)), ISRS, bêta-bloquants (certains groupes de médicaments destinés à traiter l'hypertension artérielle, certaines affections cardiaques et l'augmentation de la pression oculaire) et médicaments destinés à traiter les arythmies cardiaques (antiarythmiques). Ces médicaments peuvent augmenter le taux plasmatique de Nortriptyline Rivopharm.

- Antipsychotiques liés à un risque possible de déclenchement d'une crise d'épilepsie.

Les barbituriques (sédatifs), les contraceptifs oraux (médicament qui empêche que vous ou votre partenaire tombiez enceinte), la phénytoïne et la carbamazépine (médicaments contre l'épilepsie) peuvent diminuer le taux plasmatique de Nortriptyline Rivopharm. Il peut être nécessaire d'adapter la dose de Nortriptyline Rivopharm.

La cimétidine (utilisée dans le traitement de l'ulcère gastroduodénal), le méthylphénidate (utilisé dans le traitement de l'hyperactivité) et les inhibiteurs calciques (utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle) peuvent augmenter le taux plasmatique de Nortriptyline Rivopharm. Ces médicaments augmentent le risque d'effets indésirables. Il peut être nécessaire d'adapter la dose de Nortriptyline Rivopharm.

Informez également votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment des médicaments susceptibles d'affecter le rythme cardiaque, tels que

- Médicaments pour traiter les troubles du rythme cardiaque (tels que la quinidine et le sotalol)
- Astemizole et terféndine (pour le traitement des allergies et du rhume des foins)



- Médicaments pour traiter certains troubles psychiques (pimozide et sertindole, par exemple)
- Cisapride (pour le traitement de certaines formes d'indigestion)
- Halofantrine (pour le traitement du paludisme)
- Médicaments pour certaines affections cardiaques (par exemple, antiarythmiques de classe IA, bêta-bloquants ou inhibiteurs calciques (par exemple, vérapamil)).
- Diurétiques (diurétiques)
- Les médicaments antifongiques (pour combattre les infections fongiques), tels que le fluconazole et la terbinafine, peuvent augmenter le taux plasmatique de Nortriptyline Rivopharm. Des problèmes cardiaques sont apparus lors de l'utilisation concomitante.
- Acide valproïque (médicament utilisé pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires)
- Buprénorphine (analgésiques puissants)

La prise de ces médicaments avec Nortriptyline Rivopharm peut entraîner un syndrome sérotoninergique, une maladie potentiellement mortelle (voir rubrique «*Quels effets secondaires Nortriptyline Rivopharm peut-il provoquer?*»).

À quoi faut-il faire attention en ce qui concerne la nourriture, les boissons et l'alcool ?

Vous pouvez prendre les comprimés pelliculés avec un verre d'eau. Nortriptyline Rivopharm peut être pris avec ou sans nourriture.

Nortriptyline Rivopharm peut éventuellement potentialiser les effets sédatifs de l'alcool. L'utilisation concomitante de Nortriptyline Rivopharm et d'alcool n'est pas recommandée.

Conduite et utilisation de machines

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines! L'effet sédatif de Nortriptyline Rivopharm peut réduire votre capacité à réagir. Ne pas utiliser d'outils ni de machines.

Excipients

Nortriptyline Rivopharm contient du lactose. Si votre médecin vous a informé que vous ne tolériez pas certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Nortriptyline Rivopharm comprimés pelliculés contiennent du jaune orangé S (E 110). Peut provoquer des réactions allergiques.

Veuillez informer votre Médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- **vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !)**

Nortriptyline Rivopharm peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?



Êtes-vous enceinte, pensez-vous l'être, prévoyez-vous de l'être ou allaitez-vous ? Si c'est le cas, contactez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

En fonction du bénéfice de l'allaitement pour votre enfant et du bénéfice du traitement pour vous, votre médecin vous indiquera si vous pouvez commencer ou poursuivre l'allaitement, si vous devez l'arrêter ou si vous devez arrêter ce médicament.

Comment utiliser Nortriptyline Rivopharm ?

Utilisez toujours ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien. Vous n'êtes pas sûr de la bonne utilisation ? Si c'est le cas, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez l'impression que l'effet de Nortriptyline Rivopharm est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Utilisation chez les adultes :

Commencez par 1 comprimé pelliculé de Nortriptyline Rivopharm 50 mg une fois par jour, administré le matin ou 25 mg 2 à 3 fois par jour. Si nécessaire, le médecin peut augmenter progressivement la dose de 25 mg tous les deux jours jusqu'à une dose de 100 à 150 mg une fois par jour ou 50 mg 2 à 3 fois par jour. Les doses supérieures à 150 mg/jour sont réservées aux patients hospitalisés (jusqu'à 200 ou 225 mg par jour). Les comprimés pelliculés ajoutés doivent être pris de préférence le matin.

Si aucune amélioration n'est constatée après 2 à 4 semaines de traitement à la dose maximale, vous devez en discuter avec votre médecin. En cas de réponse satisfaisante, votre médecin poursuivra la posologie prescrite pendant au moins 4 semaines supplémentaires. Ensuite, en concertation avec vous, votre médecin essaiera de réduire progressivement la dose jusqu'à une dose d'entretien de 50 à 100 mg par jour.

Utilisation chez les patients âgés (de plus de 60 ans) :

Commencez par 1 comprimé pelliculé de Nortriptyline Rivopharm 25 mg une fois par jour ou 10 mg 2 à 3 fois par jour.

Si nécessaire, le médecin peut augmenter progressivement la dose de 10 à 20 mg tous les deux jours jusqu'à une dose de 150 mg par jour.

Les comprimés pelliculés ajoutés doivent être pris de préférence le matin.

Mode d'administration

Les augmentations de dose se font de préférence le matin. Les comprimés pelliculés sont pris avec de l'eau. La ligne de cassure sert uniquement à faciliter la cassure et la déglutition et non à diviser le comprimé pelliculé en doses égales.



Insuffisance rénale

En cas d'insuffisance rénale, votre médecin augmentera ou diminuera progressivement et avec précaution la posologie. Dans la plupart des cas, cependant, la dose habituelle sera administrée.

Insuffisance hépatique

Votre médecin dosera soigneusement la dose en cas d'altération de la fonction hépatique, si possible sur la base des mesures effectuées dans votre sang.

Utilisation chez les enfants et les adolescents jusqu'à 18 ans

Nortriptyline Rivopharm ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents. Consulter la section 2 pour plus d'informations.

Durée du traitement

Il peut s'écouler plusieurs semaines avant que vous ne commenciez à vous sentir mieux. Par conséquent, vous devez continuer à prendre Nortriptyline Rivopharm, même si cela prend un certain temps avant que vous ne ressentiez une amélioration de votre état. Ne modifiez jamais la dose du médicament sans consulter au préalable votre médecin. Vous devez continuer à prendre les comprimés pelliculés aussi longtemps que votre médecin vous les conseille. Si vous arrêtez trop tôt,

les symptômes peuvent réapparaître. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins 6 mois après s'être senti mieux.

Avez-vous pris trop de ce médicament ?

Si vous avez accidentellement pris un comprimé pelliculé de Nortriptyline Rivopharm de trop, des effets indésirables tels que somnolence, bouche sèche, vertiges ou nausées peuvent éventuellement survenir ou s'aggraver.

Si vous pensez que vous ou quelqu'un d'autre a pris trop de Nortriptyline Rivopharm, contactez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche, même en l'absence de signes de malaise ou d'empoisonnement. Emportez l'emballage de Nortriptyline Rivopharm avec vous lorsque vous vous rendez chez un médecin ou à l'hôpital.

Les symptômes d'un surdosage peuvent inclure :

- Somnolence ou agitation
- Agitation (vous êtes nerveux, excité ou agité) et hallucinations
- Perte de conscience
- Problèmes respiratoires, décoloration bleue de la peau
- Dilatation des pupilles
- Crises convulsives/vomissements (convulsions)
-



Maladie cardiaque, y compris arythmies cardiaques (observées lors d'un ECG, un examen visant à évaluer le fonctionnement du cœur)

- Pression artérielle basse, pouls faible, pâleur
- Troubles métaboliques
- Rétention d'urine dans la vessie en raison d'un trouble de la vidange de la vessie (rétention urinaire)
- Sécheresse des muqueuses (par exemple de la gorge ou de la langue)
- Diminution des selles (pouvant conduire à la constipation)
- Fièvre
- Coma

Confusion, agitation, hallucinations et altération de la motricité fine sont possibles au réveil.

Avez-vous oublié de prendre ce médicament ?

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre ce médicament

Vous ne devez pas arrêter de prendre Nortriptyline Rivopharm avant que votre médecin ne le décide. Le traitement se poursuit de préférence pendant 4 à 6 mois après la disparition des symptômes.

Le traitement ne doit pas être interrompu d'un seul coup. La dose doit être réduite progressivement sur une semaine ou plus. Bien que les antidépresseurs ne créent pas de dépendance, l'arrêt brutal du traitement après une utilisation prolongée peut provoquer des nausées, des maux de tête, une sensation de malaise, de l'irritabilité et de l'insomnie. Par conséquent, le traitement par Nortriptyline Rivopharm ne doit pas être interrompu abruptement. La dose doit être réduite progressivement sur une semaine ou plus.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Si c'est le cas, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Nortriptyline Rivopharm peut-il provoquer ?

Comme les patients déprimés peuvent présenter un certain nombre de symptômes similaires aux effets indésirables des antidépresseurs, il est souvent difficile de déterminer si les symptômes sont une conséquence de la dépression ou s'ils sont causés par le médicament utilisé pour traiter la dépression. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de prendre ce médicament et contactez immédiatement votre médecin :

L'augmentation de la pression intraoculaire (pression élevée dans l'œil) ne s'accompagne généralement d'aucun signe ou symptôme, mais elle constitue un facteur de risque important pour le



glaucome. En cas de crises de vision floue, de vision en arc-en-ciel et de douleurs oculaires, vous devez subir un examen ophtalmologique immédiatement avant de poursuivre le traitement par ce médicament, car ces symptômes peuvent être des signes de glaucome. effet indésirable qui survient parfois et qui peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100.

Constipation sévère, gonflement de l'estomac, fièvre et vomissements. Ces symptômes peuvent indiquer une incapacité à aller à la selle (iléus paralytique). Effet indésirable rare, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.

Jaunissement de la peau et du blanc des yeux (jaunisse). Votre foie peut être affecté. effet indésirable rare, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.

Ecchymoses, tendance aux saignements, pâleur ou maux de gorge persistants et fièvre ; ces symptômes peuvent être les premiers signes d'une maladie du sang.

Les effets sur le sang peuvent inclure une diminution du nombre de globules rouges (qui transportent l'oxygène dans le corps), de globules blancs (qui aident à combattre les infections) et de plaquettes (qui permettent au sang de coaguler). Effet indésirable rare, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.

Pensées et comportements suicidaires*. Effet indésirable dont la fréquence n'est pas connue, la fréquence ne peut pas être déterminée avec les données disponibles.

- Contractions rythmiques involontaires des muscles, y compris des muscles qui contrôlent les mouvements de l'œil, une agitation, des hallucinations, un coma, une transpiration excessive, des tremblements, une exagération des réflexes, une augmentation de la tension musculaire, une température corporelle supérieure à 38 °C (signes d'une affection potentiellement mortelle appelée syndrome sérotoninergique). Effet indésirable dont la fréquence n'est pas connue, la fréquence ne peut pas être déterminée avec les données disponibles.

* Des cas de personnes ayant des pensées ou des comportements d'automutilation ou d'idées suicidaires pendant l'utilisation de Nortriptyline Rivopharm ou peu après le traitement par Nortriptyline Rivopharm ont été rapportés (voir rubrique 2 « Quand faut-il être particulièrement prudent avec ce médicament »).

En plus des effets susmentionnés, les effets indésirables suivants ont été signalés. Ils sont plus marqués au début du traitement et s'atténuent le plus souvent pendant la durée du traitement : Très fréquent (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

- Tremblements, vertiges, maux de tête

Trouble de l'adaptation à la vision de loin (déviation de l'accommodation qui fait que les objets apparaissent flous et mal cadrés)

- Palpitations, accélération du rythme cardiaque (tachycardie)
- Bouche sèche, constipation, nausées
- Transpiration excessive

Fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- Confusion, diminution de l'envie d'avoir des rapports sexuels (diminution de la libido)

Troubles de l'attention, troubles du goût, perception de picotements, de démangeaisons ou de fourmillements sans cause (paresthésie), troubles de la coordination, par exemple, démarche en état



d'ébriété (ataxie)

- Dilatation pupillaire (mydriase)

Certains troubles de la conduction cardiaque entraînant des arythmies (bloc auriculo-ventriculaire), des troubles de la conduction

- Dysfonctionnement érectile
- Fatigue
- Prise de poids
- Anomalies du cœur se traduisant par des modifications de l'électrocardiogramme (ECG)

Vertiges en position debout en raison d'une hypotension artérielle (hypotension orthostatique) Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

(forme allégée de) Gaïeté excessive accompagnée de beaucoup d'énergie ((hypo)manie), anxiété, insomnie, cauchemars

- Crises d'épilepsie ou convulsions
- Acouphènes
- Augmentation de la pression artérielle (hypertension)
- Diarrhée, vomissements, accumulation de liquide dans la langue (œdème de la langue)

Éruption accompagnée de fortes démangeaisons et de la formation de bosses (urticaire), accumulation de liquide dans le visage (œdème facial)

Rétention d'urine dans la vessie en raison d'un trouble de la vidange de la vessie (rétention urinaire)

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Perte d'appétit
- Confusion aiguë (délire) chez les patients âgés, idées délirantes (hallucinations)
- Déviation du rythme cardiaque ou de la fréquence cardiaque
- Hypertrophie des glandes salivaires
- Calvitie (alopécie)
- Sensibilité à la lumière (réaction de photosensibilité)
- Développement des seins chez les hommes (gynécomastie)
- Fièvre
- Réduction de poids

Test de la fonction hépatique anormal, taux élevé de certaines enzymes hépatiques dans le sang

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Rétention d'eau et diminution du taux de sel (sodium) dans le sang (syndrome de sécrétion inadéquate de l'hormone antidiurétique (SIADH)).

Excitation (agitation), agitation, agressivité, délire, trouble orgasmique féminin, augmentation du désir sexuel (augmentation de la libido), être confus (désorientation)

- Congestion biliaire (cholestase)

Syndrome de Brugada (révélation) (les symptômes peuvent comprendre un rythme cardiaque très rapide, des vertiges, des évanouissements, des convulsions) Consultez immédiatement votre médecin



si vous présentez ces symptômes

Taux faible de sel (sodium) dans le sang Un risque plus élevé de fractures osseuses a été observé chez les patients prenant ces types de médicaments.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Garder hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Ne pas jeter les médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments que vous ne prenez plus. Ils seront ensuite détruits de manière responsable et ne se retrouveront pas dans l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Nortriptyline Rivopharm ?

Principes actifs

Chaque comprimé pelliculé de Nortriptyline Rivopharm contient du chlorhydrate de nortriptyline, correspondant respectivement à 10 et 25 mg (milligrammes) de nortriptyline.

Excipients

Nortriptyline Rivopharm 10 mg comprimés pelliculés : sont de forme ronde et biconvexe, de couleur blanche, contient 43,0 mg de lactose monohydraté, stéarate de magnésium, amidon prégélatinisé, hydrogénophosphate de calcium. Pelliculage : hypromellose, macrogol 8000, macrogol 400.

Nortriptyline Rivopharm 25 mg comprimés pelliculés : sont de forme ronde et biconvexe, de couleur orange, contient 107,4 mg de lactose monohydraté, stéarate de magnésium, amidon prégélatinisé, hydrogénophosphate de calcium. Pelliculage : hypromellose, macrogol 8000, macrogol 400, jaune orangé S (E110) (0,04 mg).

Numéro d'autorisation

69554

Où obtenez-vous Nortriptyline Rivopharm ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.



Comprimés pelliculés à 10 mg: emballages de 50 comprimés pelliculés Comprimés
pelliculés à 25 mg: emballages de 50 comprimés pelliculés

Titulaire de l'autorisation

Rivopharm SA, Centro Insema, 6928 Manno, Suisse.

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en Août 2024 par l'autorité de contrôle
des médicaments (Swissmedic).**

