

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

apo-ENTERIT, globules

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand apo-ENTERIT est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes de la spagyrie, apo-ENTERIT peut être utilisé en cas de diarrhée.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si apo-ENTERIT peut être pris simultanément.

Quand apo-ENTERIT ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Le médecin doit être consulté en cas de diarrhée chez les enfants de moins de 3 ans. Si la diarrhée s'accompagne de fièvre ou en cas de suspicion de sang dans les selles, un médecin ou un pharmacien doit être consulté. Il convient de veiller à un apport suffisant de liquide et d'électrolytes, en particulier chez les personnes âgées et les enfants. Si les troubles persistent plus de trois jours ou s'ils se reproduisent, un médecin ou un pharmacien doit être consulté. Veuillez prendre apo-ENTERIT uniquement après consultation de votre médecin si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

apo-ENTERIT peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser apo-ENTERIT?

Sauf prescription contraire du médecin, les adultes et les adolescents dès 12 ans prennent 10 globules 3 à 4 fois par jour, les enfants de moins de 12 ans 8 globules 3 à 4 fois par jour, les enfants de moins de 6 ans 4 à 6 globules 3 à 4 fois par jour. Laisser fondre les globules dans la bouche.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires apo-ENTERIT peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec apo-ENTERIT et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de apo-ENTERIT n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient apo-ENTERIT?

1 g de globules (70 - 90 globules) contient:

Principes actifs

Artemisia abrotanum e stipite et foliis spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,75 mg

Gratiola officinalis (HAB) D4 1,65 mg

Peumus boldus e folium spag. Peka D3 (HAB 47b) 1,65 mg

Podophyllum peltatum (HAB) D4 1,75 mg

Potentilla anserina ex herba cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 2,00 mg

Veratrum album (HAB) D6 1,20 mg

Excipients

Saccharose 1g

Numéro d'autorisation

54386 (Swissmedic)

Où obtenez-vous apo-ENTERIT? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.



Emballage de 10 g.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

