

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

apo-ENTERIT, globuli

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa apo-ENTERIT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, apo-ENTERIT può essere usato in caso di diarrea.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere apo-ENTERIT.

Quando non si può assumere apo-ENTERIT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di diarrea nei bambini di età inferiore ai 3 anni è necessario consultare un medico. Se la diarrea è accompagnata da febbre o se si sospetta la presenza di sangue nelle feci, è necessario consultare un medico o un farmacista. Soprattutto negli anziani e nei bambini, occorre prestare particolare attenzione a garantire un apporto sufficiente di liquidi ed elettroliti. Se i disturbi persistono per più di tre giorni o se si ripetono, consultare un medico o un farmacista. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere apo-ENTERIT durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare apo-ENTERIT?

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti e gli adolescenti dai 12 anni in su assumono 10 globuli 3-4 volte al giorno, i bambini di età inferiore ai 12 anni 8 globuli 3-4 volte al giorno, i bambini di età inferiore ai 6 anni 4-6 globuli 3-4 volte al giorno. Lasciare sciogliere i globuli in bocca.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che



l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere apo-ENTERIT?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con apo-ENTERIT e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di apo-ENTERIT.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con „Verwendbar bis“ sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene apo-ENTERIT?

In 1 g di globuli (70-90 globuli) vengono elaborati:

Principi attivi

Artemisia abrotanum e stipite et foliis spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,75 mg

Gratiola officinalis (HAB) D4 1,65 mg

Peumus boldus e folium spag. Peka D3 (HAB 47b) 1,65 mg

Podophyllum peltatum (HAB) D4 1,75 mg

Potentilla anserina ex herba cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 2,00 mg

Veratrum album (HAB) D6 1,20 mg

Sostanze ausiliarie

Saccharose 1g

Numero dell'omologazione

54386 (Swissmedic)

Dove è ottenibile apo-ENTERIT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 10 g.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach



Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

