

INFORMAZIONI DESTINATE AI PAZIENTI

Legga attentamente questo foglio prima di assumere il farmaco.

Questo farmaco le è stato consegnato personalmente ed è soggetto a prescrizione medica. Quindi, non lo dia ad altri, anche se sembrano avere gli stessi sintomi. In effetti, questo farmaco può essere nocivo per la loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Doxium® 500 / Doxium® 1000

OM Pharma SA

Che cos'è Doxium e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Il principio attivo di Doxium è il calcio dobesilato,

Questo agisce sui piccoli vasi sanguigni, i capillari, normalizzando la resistenza e la permeabilità della loro parete. Migliora il flusso sanguigno venoso e, nei disturbi della circolazione venosa, contribuisce a diminuire il gonfiore delle caviglie (edema) e ad alleviare formicolii, dolori e crampi.

Doxium è utilizzato su prescrizione medica, nei seguenti casi:

- disturbi della microcircolazione sanguigna in caso di diabete (retinopatia diabetica)
- affezioni cutanee legate a disturbi venosi
- varici con œdemi, formicolii, dolori e crampi
- emorroidi
- come integrazione di altri trattamenti in casi di complicazioni conseguenti a infiammazione delle vene (flebite)
- come integrazione del trattamento chirurgico o sclerosante delle varici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se soffre di retinopatia diabetica, è tenuto a seguire scrupolosamente il regime dietetico stabilito dal suo medico, allo scopo di stabilizzare il diabete e non deve smettere di assumere altri farmaci che le sono stati prescritti per curare il diabete.

Se soffre di disturbi venosi, in particolare se ha delle varici, è opportuno tenere sotto controllo il peso corporeo, evitare di rimanere in piedi per periodi prolungati e mantenere i piedi sollevati quando si corica. Segua i consigli del suo medico che può raccomandarle esercizi specifici o di indossare calze contenitive. Tuttavia, l'assunzione di Doxium non dovrebbe sostituire queste misure.

Quando non si può usare Doxium?

Doxium non va assunto in caso di allergia al calcio dobesilato o a un qualsiasi altro componente di questo farmaco, indicato nella sezione «Cosa contiene Doxium?».

Il suo medico sa come agire in queste situazioni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Doxium?

In casi molto rari, la somministrazione di Doxium può causare agranulocitosi, una patologia in cui l'importante riduzione dei globuli bianchi si traduce in un aumento del rischio di infezioni. In questa situazione, i sintomi possono includere: febbre alta, infezioni del cavo orale (angina), mal di gola, infiammazioni ano-genitali e altri sintomi che sono segni comuni di un'infezione. Se avverte uno qualsiasi di questi sintomi, sospenda *immediatamente* il trattamento e contatti il medico.

Doxium può provocare reazioni allergiche gravi (shock o reazione anafilattica) con sintomi quali reazioni cutanee, febbre, difficoltà respiratorie o vertigini. In questo caso, sospenda immediatamente il trattamento e contatti il medico.



Informi il medico anche:

- in caso di insufficienza renale, in particolare se necessita di dialisi, in quanto il dosaggio può essere ridotto dal medico.
- in caso di insufficienza epatica

Doxium può alterare i valori di creatinina sierica nelle analisi di laboratorio. Pertanto, informi il medico di qualsiasi analisi di laboratorio, soprattutto se sa che i controlli interessano i reni.

L'assunzione di Doxium può provocare effetti indesiderati come nausea, mal di testa, affaticamento. Pertanto è necessario prestare attenzione nella guida e nell'utilizzo di macchinari.

Informi il medico o il farmacista se:

- è affetto da altre patologie,
- soffre di allergie,
- assume già altri farmaci (anche di automedicazione!).

Si può somministrare Doxium durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza

Il farmaco non deve essere utilizzato in gravidanza se non espressamente prescritto dal medico.

Se è incinta, se pensa di essere incinta o sta pianificando una gravidanza, consulti il medico o il farmacista prima di assumere questo farmaco.

Allattamento

Come precauzione, conviene interrompere il trattamento o l'allattamento. Consulti il suo medico prima di utilizzare Doxium in questa situazione.

Come usare Doxium?

Posologia

Riservato agli adulti. L'uso e la sicurezza di Doxium non sono stati testati nei bambini e negli adolescenti.

In genere, 1 o 2 capsule (molli) da 500 mg o 1 compressa rivestita da 1000 mg, 1 o 2 volte al giorno.

Doxium deve essere assunto durante o subito dopo i pasti con un po' d'acqua, per ridurre al minimo il fastidio allo stomaco.

Questi dosaggi possono essere aumentati o diminuiti dal medico a seconda della gravità della patologia e secondo l'evoluzione della stessa. Solo il medico può decidere la durata del trattamento.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Doxium?

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100):

Dolori addominali, nausea, diarrea, vomito, cefalea, dolori articolari, dolori muscolari.

Se avverte uno qualsiasi di questi sintomi, sospenda ***immediatamente*** il trattamento e contatti il medico.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1'000):

Febbre, brividi, sensazione di debolezza, affaticamento, ipersensibilità (eruzione cutanea, infiammazione allergica della pelle, prurito, orticaria, gonfiore del viso).

Se avverte uno qualsiasi di questi sintomi, sospenda ***immediatamente*** il trattamento e contatti il medico.

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000):

Grave riduzione dei globuli bianchi che rende più probabile la contrazione di infezioni (agranulocitosi).



Singoli casi:

Riduzione del numero di globuli bianchi chiamati «neutrofili» (neutropenia), riduzione del numero dei globuli bianchi (leucopenia).

In caso di variazioni della crasi ematica, il suo medico sa come agire.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Doxium 500:

Questo farmaco deve essere conservato a temperatura ambiente (15-25 °C). Deve essere conservato nella sua confezione originale per proteggerlo dall'umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Doxium 1000:

Questo farmaco deve essere conservato a una temperatura inferiore ai 25°C. Deve essere conservato in un luogo asciutto nella sua confezione originale e tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Per ulteriori informazioni, consultare il medico o il farmacista che possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Doxium?

Principi attivi

1 capsula (molle) di Doxium 500 contiene 500 mg di calcio dobesilato monoidrato.

1 compressa rivestita di Doxium 1000 contiene 1000 mg di calcio dobesilato monoidrato.

Sostanze ausiliarie

Gli altri ingredienti di Doxium 500 sono: indigotina (E132, un colorante), magnesio stearato, amido di mais, gelatina, ossido ferrico monoidrato giallo (E172), biossido di titanio (E171), acqua.

Gli altri ingredienti di Doxium 1000 sono: indigotina (E132), giallo chinolina (E104), magnesio stearato, biossido di titanio (E171), ipromellosa, cellulosa microcristallina, acido stearico.

Numero dell'omologazione

39217, 61059 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Doxium 500? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, soggetto a prescrizione (B).

Capsula, 500 mg: confezione da 30 o 60 capsule.

Compressa rivestita, 1000 mg: confezione da 30 o 60 compresse rivestite.

Titolare dell'omologazione

OM Pharma SA, Meyrin, Svizzera.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

