

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Riopan Gel®/Riopan Gel® Forte

Takeda Pharma AG

Che cos'è Riopan Gel/Riopan Gel Forte e quando si usa?

Riopan Gel/Riopan Gel Forte viene assunto in caso di bruciori di stomaco, rigurgito acido o sensazione di peso e di gonfiore dello stomaco.

Il principio attivo, il magaldrato, diminuisce la quantità di acidi, lega la pepsina e i componenti della bile e, tramite uno strato protettivo sulla mucosa, elimina l'azione aggressiva del succo gastrico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

È importante fare attenzione allo stile generale di vita e di alimentazione. È opportuno evitare lo stress e i cibi individualmente non tollerati, il consumo eccessivo di alcol e tabacco.

Quando non si può assumere Riopan Gel/Riopan Gel Forte?

In caso d'ipersensibilità nota al principio attivo magaldrato o a una delle sostanze ausiliarie del medicamento e in caso di riduzione dei livelli di fosfato nel siero (ipofosfatemia).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Riopan Gel/Riopan Gel Forte?

Riopan Gel/Riopan Gel Forte non si può assumere per più di 2 settimane senza aver consultato il medico. In caso di uso prolungato può comparire un'alterazione dei sali nel sangue, in particolare del calcio e dei fosfati.

I pazienti con malattie renali possono assumere il preparato soltanto dopo aver consultato il medico.

Se i disturbi persistono a lungo e/o ricompaiono a intervalli frequenti, il medico deve escludere la presenza di una malattia grave.

L'assunzione contemporanea di Riopan Gel/Riopan Gel Forte può ridurre l'assorbimento di molti altri medicinali (ad es. per il cuore o antibiotici). Altri medicinali devono quindi essere presi almeno 2 ore prima o dopo l'assunzione di Riopan Gel/Riopan Gel Forte.

Le bevande contenenti acidi (ad es. succhi di frutta, vino, compresse effervescenti con acido citrico o acido tartarico) favoriscono l'assorbimento dell'alluminio contenuto in Riopan Gel/Riopan Gel Forte. Di conseguenza, occorre evitare nel limite del possibile di assumere Riopan Gel/Riopan Gel Forte assieme a bevande contenenti acidi.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per 10 ml di gel, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Riopan Gel/Riopan Gel Forte durante la gravidanza o l'allattamento?

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.



Durante la gravidanza e l'allattamento può assumere Riopan Gel/Riopan Gel Forte solo dopo aver consultato il suo medico.

Come usare Riopan Gel/Riopan Gel Forte?

Adulti: in generale, in caso di lievi disturbi di stomaco, prendere il contenuto di un sacchetto di Riopan Gel/Riopan Gel Forte ½ - 1 ora dopo mangiato o alla comparsa dei disturbi.

Non va superata la dose giornaliera di 6400 mg di magaldrato (corrispondenti a 8 sacchetti di Riopan Gel o a 4 sacchetti di Riopan Gel Forte).

Finora l'impiego e la sicurezza nei bambini e negli adolescenti non sono stati oggetto di studio.

Per l'assunzione di Riopan Gel/Riopan Gel Forte in sacchetti si attenga alle seguenti avvertenze: agitare Riopan Gel/Riopan Gel Forte nel sacchetto chiuso. Quindi serrare il sacchetto tra pollice e indice e strappare lungo la linea demarcata per aprirlo. Per l'assunzione del gel, portare il sacchetto alla bocca con l'apertura ben chiusa, spremere il contenuto e ingerire il gel.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Riopan Gel/Riopan Gel Forte?

Soprattutto a dosi elevate, possono manifestarsi feci molli, aumento della frequenza d'evacuazione e in casi molto rari diarrea o stipsi.

In caso di uso prolungato può comparire un'alterazione dei sali nel sangue, in particolare del calcio e dei fosfati.

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

Feci molli

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000)

Diarrea, aumento dei livelli di magnesio (ipermagnesemia)

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori della portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Riopan Gel/Riopan Gel Forte?

Principi attivi

10 ml di Riopan Gel: 800 mg magaldrato.

10 ml di Riopan Gel Forte: 1600 mg magaldrato.

Sostanze ausiliarie

Gel: Argento solfato, clorexidina digluconato, sodio ipoclorito o calcio ipoclorito, gomma arabica essiccata, ipromellosa, maltolo, simeticone, metilcellulosa, acido sorbico (E200), sodio ciclamato, aromi, acqua depurata.



Gel Forte: Argento solfato, clorexidina digluconato, calcio ipoclorito, gomma arabica essiccata, ipromellosa, maltolo, simeticone, metilcellulosa, acido sorbico (E200), sodio ciclamato, aromi, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

46515 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Riopan Gel/Riopan Gel Forte? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 20 e 50 sacchetti da 10 ml di Riopan Gel.

Confezioni da 10 e 20 sacchetti da 10 ml di Riopan Gel Forte.

Titolare dell'omologazione

Takeda Pharma SA, 8152 Opfikon

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel aprile 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

