

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Circuvin

Gocce omeopatiche per la circolazione

Medicamento omeopatico

Che cos'è il Circuvin e quando si usa?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Circuvin può essere somministrato per il trattamento di disturbi circolatori accompagnati da sintomi come vertigini, debolezza e capogiro, il trattamento di disturbi cardiaci di origine nervosa e di crampi alle gambe.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Nel caso di manifestazione improvvisa o persistenza di sintomi come irregolarità del polso, battito cardiaco accelerato, dolori pungenti nel torace o insufficienza respiratoria, occorre consultare un medico che stabilirà se sussistono malattie organiche del cuore o dei vasi sanguigni o se i disturbi hanno origine nervosa. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Circuvin.

Quando non si può usare il Circuvin e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Finora non sono conosciute limitazioni d'uso. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie, o,
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa!)

Si può somministrare il Circuvin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare il Circuvin?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti, prendere 1 volta al giorno 10 gocce diluite in acqua.

Attenersi alla dose indicata nel prospetto o prescritta dal medico. Se in caso di trattamento di un bambino non si ottiene il miglioramento desiderato, lo faccia visitare da un medico. Se vi sembra che il prodotto



abbia un effetto troppo debole o troppo forte, parlatene con il vostro medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il Circuvin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Circuvin.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Circuvin e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "EXP" sulla confezione.

Conservi a temperatura ambiente (15 – 25°C). Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Questo medicamento contiene 50 vol.% d'alcol.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al medico, al farmacista o al droghiere.

Che cosa contiene il Circuvin?

1 ml Circuvin contiene: Aconitum napellus D12 (HAB 2a), Arnica montana D4 (HAB 4a), Gelsemium sempervirens D6 (HAB 3a), Vipera berus D12 (HAB 5a) 25% di ciascuno, come anche 50 vol.% d'alcol. 24 gocce corrispondono a 1 ml.

Numero dell'omologazione

58741 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Circuvin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica. Confezioni: Flaconi da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Herbamed AG, CH-9004 St. Gallen

Indirizzo postale:

Herbamed AG, CH-9055 Bühler

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2008 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

